13853-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# СЕМЕНА БОБОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 13853—78

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Государственным комитетом лесного хозяйства СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Е. С. Любич, Е. А. Шахова, И. М. Кривенко

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом лесного хозяйства СССР

Зам. председателя Л. Е. Михайлов

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1978 г. № 2991

УДК 631.53.01 : 634.0.232.31 : 006.354 Группа С91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СЕМЕНА БОБОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

**Технические условия**

Seeds of leguminose forest trees and shrubs. Sowing characteristics. Specification

**ГОСТ 13853—78**

**Взамен ГОСТ 13853—68**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1978 г. № 2991 срок действия установлен**

**с 01.01. 1980 г.**
**до 01.01. 1985 г.**

продлен до 01.01.90 г

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону** изъято

Настоящий стандарт распространяется на семена бобовых деревьев и кустарников, предназначенные для посева.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Семена бобовых деревьев и кустарников должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Семена должны быть собраны на лесосеменных участках и плантациях, в насаждениях или с отдельных деревьев (кустов), признанных пригодными для сбора семян в установленном порядке.

1.3. По посевным качествам семена подразделяют на три класса: 1, 2, 3-й в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

| Наименование вида | Класс | Всхожесть, жизнеспособность, %, не менее | Чистота, %, не менее |
|---|---|---|---|
| Альбиция ленкоранская<br>Albizia julibrissin Durazz. | 1<br>2<br>3 | 95<br>85<br>50 | 90 |
| Аморфа кустарниковая<br>Amorpha fruticosa L. | 1<br>2<br>3 | 95<br>80<br>60 | 98 |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

©Издательство стандартов, 1979

*Продолжение*

| Наименование вида | Класс | Всхожесть, жизнеспособность, %, не менее | Чистота, %, не менее |
|---|---|---|---|
| Бобовник анагиролистный, или золотой дождь<br>Laburnum anagyroides Medic. | 1<br>2<br>3 | 90<br>65<br>50 | 90 |
| Гледичия трехколючковая (гледичия обыкновенная)<br>Gleditsia triacanthos L. | 1<br>2<br>3 | 95<br>75<br>55 | 93 |
| Дрок испанский<br>Genista hispanica L. | 1<br>2<br>3 | 95<br>85<br>70 | 92 |
| Жарновец метельчатый<br>Sarothamnus scoparius (L.) Koch | 1<br>2<br>3 | 85<br>70<br>60 | 96 |
| Карагана древовидная, или желтая акация<br>Caragana arborescens Lam. | 1<br>2<br>3 | 90<br>75<br>55 | 90 |
| Лespедеца двуцветная<br>Lespedeza dicolor Turcz. | 1<br>2<br>3 | 85<br>65<br>50 | 93 |
| Маакия амурская<br>Maackia amurensis Rupr. et Maxim. | 1<br>2<br>3 | 95<br>85<br>70 | 92 |
| Пузырник древовидный<br>Colutea arborescens L. | 1<br>2<br>3 | 85<br>75<br>50 | 85 |
| Софора японская<br>Sophora japonica L. | 1<br>2<br>3 | 90<br>70<br>50 | 90 |
| Церцис европейский, Иудино дерево<br>Cercis siliquastrum L. | 1<br>2<br>3 | 95<br>85<br>70 | 90 |
| Чингиль, чемыш серебристый<br>Halimodendron halodendron—(Pall) Voss | 1<br>2<br>3 | 90<br>75<br>70 | 82 |
| Робиния лжеакация, белая акация:<br>Robinia pseudoacacia L.— | 1<br>2<br>3 | 90<br>70<br>50 | 95 |
| для семян, собираемых в Белорусской ССР, Литовской ССР, Брянской, Волынской, Куйбышевской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Черниговской, Ровенской и Тульской областях | | | |
| для семян, высеваемых в остальных областях, краях, автономных и союзных республиках | 1<br>2<br>3 | 95<br>80<br>70 | 95 |

1.4. Семена должны иметь цвет, свойственный семенам данного вида, и быть без плесени и постороннего запаха.

1.5. При закладке на длительное хранение семена робинии лжеакации должны иметь влажность 9—11%, а семена других видов 11—12%.

1.6. Семена, зараженные паразитными грибами, должны быть протравлены перед стратификацией или посевом.

1.7. В семенах не допускается наличие карантинных сорняков (семян и плодов), болезней и вредителей в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР.

## 2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

2.1. Определение посевных качеств семян — по ГОСТ 13056.1-67—ГОСТ 13056.4-67, ГОСТ 13056.5—76, ГОСТ 13056.6—75, ГОСТ 13056.7—68, ГОСТ 13056.9-68—ГОСТ 13056.11-68.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Семена упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 и тканевые мешки по ГОСТ 18225—72.

3.2. На каждый мешок наклеивают и вкладывают внутрь этикетку по ГОСТ 13056.1—67.

3.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.4. Семена транспортируют в мешках всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Допускается транспортировать семена насыпью автомобильным и гужевым транспортом с укрытием их водонепроницаемым материалом.

3.5. Семена хранят в складах при относительной влажности воздуха 60—70% в мешках, деревянных ящиках или закромах. Мешки с семенами подвешивают в складе так, чтобы они не соприкасались со стенами и потолком.

Ящики и закрома с семенами сверху закрывают деревянными крышками, дно их должно быть приподнято на высоту 15—20 см от пола.

На длительное хранение закладывают семена 1 и 2-го классов.

3.6. В период длительного хранения семена содержат в стеклянных бутылях, металлических сосудах, закрытых герметически и установленных на стеллажи или полки.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
хнический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 30.11.78 Подп. в печ. 20.12.78 0,375 п. л. 0,22 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1599