ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ЗАЙЦА-РУСАКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6363—67

Издание официальное

БЗ 6—93 /ОСС

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 639.112.2.002.3:006.354 Группа С82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ЗАЙЦА-РУСАКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Gray Hare skins undressed. Specifications

ОКП 98 7843

ГОСТ 6363—67*

Взамен ГОСТ 6363—52

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.06.67 Срок введения установлен с 01.07.68

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки зайца-русака из отряда грызунов, семейства заячьих.

2. Шкурки зайца-русака зимой должны иметь волосяной покров серо-голубой или бело-серо-голубой окраски разной интенсивности с большим или меньшим овалом каштановой окраски по хребту. Бока и черево белые или серо-желтые. Остевые волосы шкурок слегка волнистые, хвост с черной полосой вдоль его верхней части.

3. Шкурки зайца-русака должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку или пластом, с продольным разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха головы, лап до ступни и хвоста; очищены от приразей мяса, сухожилий, костей из лап, ушных хрящей; очищены от грязи и крови с мездры и волоса и законсервированы пресно-сухим способом. Шкурки, снятые трубкой, должны быть оправлены мездрой наружу (высушены на правилках).

4. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки зайца-русака делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Сорт	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок
Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом или со слегка поре-

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1988 г. (ИУС 12—88).*

© Издательство стандартов, 1994

Продолжение табл. 1

Сорт	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок
	девшими остевыми и пуховыми волосами на боках и огузке; мездра плотная или уплотненная, грубоватая, без признаков синевы или с легкой синевой по краю огузка, бокам и душке
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направляющими остевыми и пуховыми волосами, особенно на боках и шейной части; мездра плотная с синевой по бокам, душке и на огузке
Третий	Полуволосый, со слаборазвившимися остью и пухом, с наличием на боках и шейной части летних остевых волос рыжей окраски; мездра плотная, темно-синяя по бокам и шейной части

5. В зависимости от наличия пороков шкурки зайца-русака подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование порока	Группа дефекта		
	Малый	Средний	Большой
1. Дыры общей площадью к площади шкурки в %	1,1—3,0	3,1—10,0	10,1—20,0
2. Плешины общей площадью к площади шкурки в %	1,1—3,0	3,1—8,0	8,1—15,0
3. Запекшаяся кровь на волосе общей площадью к площади шкурки в %	3,1—5,0	5,1—10,0	10,1—20,0

Примечание. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки, правленой на правилках, и на полную ширину шкурки, снятой пластом.

6. В дефектных шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», три порока, предусмотренных для группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», один порок, предусмотренный для группы дефектов «средний», и два

порока из группы дефектов «малый» или два порока, предусмотренных для группы дефектов «средний».

7. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, шкурки весенние, поздневесенние с сильно поредевшим тусклым волосяным покровом, летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, раннеосенние с едва начавшими развиваться остью и пухом, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8 **(Исключен, Изм. № 1).**

9. Упаковку и маркировку шкурок зайца русака производят по ГОСТ 12266—89

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок зайца-русака в процентах к стоимости шкурок первого сорта (рекомендована Центросоюзом)

Сорта	Нормальные	Группы дефектов		
		Малый	Средний	Большой
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	75,0	67,5	56,3	37,5
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

Скидка от зачетной стоимости в %:

за неправильную первичную обработку (комовая сушка)	10
за недостачу частей шкурки (вырезанное черево)	25

Примечание Нестандартные шкурки оценивают не более 25% качества шкурок первого сорта группы дефектов «нормальных».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в набор 28.11.85. Подп. в печ. 20.12.93. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,36. Уч.-изд. л. 0,23. Тир. 263 экз. С 500

Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 536

gost.e-ecolog.ru