ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 2974—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 04.10.88 Подп. в печ. 03.11.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,40 уч.-изд. л. Тир. 2 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2981

УДК 675.03:636.92:006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ

**Технические условия**

Dressed hair rabbit skins.
Specifications

**ГОСТ 2974—75***

**Взамен ГОСТ 2974—64**

ОКП 89 1341

**Утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 июля 1975 г. № 1985 г. Срок введения установлен с 01.01.76**

**Проверен в 1985 г. Срок действия продлен до 01.01.91**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные меховые шкурки кролика всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова, предназначенные для изготовления меховых изделий.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом, с сохранением их конфигурации, и симметрично расправлены.

1.1а. Шкурки кролика должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

1.2. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, давать потяжку по всем направлениям.

На шкурках кролика с толщиной кожевой ткани до 0,5 мм допускается наличие подкожно-мускульной пленки на огузке, боках и черене.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашеных шкурок — равномерно окрашенным или с нанесением рисунка.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г. и декабре 1985 г. (ИУС 11—80, 2—86).*

© Издательство стандартов, 1988

Волосяной покров стриженых шкурок должен быть равномерно подстриженным высотой от 6 до 18 мм.

Волосяной покров стриженых с удаленной остью шкурок должен состоять из пуховых волос.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, закусы, недостающие части (обрывы) должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурок.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, могут не вычиниваться, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60, 70, 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—87 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва.

Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 1,5 мм в зависимости от толщины кожевой ткани.

1.4, 1.5. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок кролика должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Температура сваривания кожевой ткани шкурок, °С, не ниже | 65 |
| Массовая доля влаги в кожевой ткани шкурок в момент отбора проб, %, не более | 14 |
| Массовая доля несвязанных жировых веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество, %: | |
| в кожевой ткани | 12—20 |
| в волосяном покрове, не более | 2 |
| pH водной вытяжки кожевой ткани | 3,5—7,0 |
| Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани шкурок в пересчете на абсолютно сухое вещество, %: | |
| некрашенных и крашенных окислительными и кубовыми красителями | 0,5—1,5 |
| крашенных кислотными красителями, не более | 3,0 |
| Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее | 50(5) |
| Устойчивость окраски волосяного покрова сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее, шкурок: | |
| крашенных окислительными красителями в черный цвет | 3 |
| крашенных кислотными красителями в черный цвет | 4 |
| крашенных в коричневый, серый и другие цвета | 4 |

1.7. **(Исключен, Изм. № 2).**

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки кролика подразделяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование окраски | Описание окраски волосяного покрова |
|---|---|
| **Некрашеные шкурки** | |
| Белая | Чисто белая |
| Голубая | Однотонная голубовато-серая различной интенсивности. Черево такой же окраски или светлее |
| Шиншилловая | Голубовато-серая различной интенсивности. На хребте и боках с черной вуалью. Остевые волосы зонарные, черево белого цвета |
| Серебристая | Серая различной интенсивности на хребте и боках за счет различного соотношения белых и пигментированных остевых волос. Черево такой же окраски или светлее |
| Вуалево-серебристая | Серебристая с хорошо выраженной вуалью, образованной черными кончиками остевых и направляющих волос |
| Черно-бурая | Черно-бурая, более темная на хребте, с серебристостью на боках, остевые волосы зонарные. Черево более светлой окраски |
| Серозаячья | Серо-желтоватая различной интенсивности на хребте и боках. Остевые волосы зонарные. Черево белое или серое |
| Пестрая | Белая с темными пятнами различной интенсивности, расположенными на хребте и боках |
| Коричневая | Коричневая на хребте и боках различной интенсивности. Черево такой же окраски или светлее |
| **Крашеные шкурки** | |
| Черная | Черная с прокрасом не менее 2/3 длины волоса с черным, темно-серым или темно-вишневым основанием или черная с незначительным синим оттенком |
| Одноцветная | Коричневая, серая и других цветов однотонная, а также с переходами в интенсивности окраски от хребтового к боковым участкам и от концов ости к пуху |
| Многоцветная | С незакрашенными кончиками ости при окрашенном основании волос: с нанесением различных рисунков |

1.6—1.8. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки кролика подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Сорт | Характеристика волосяного покрова шкурок | | |
|---|---|---|---|
| | нестриженых | стриженых | стриженых с удаленной остью |
| Первый | Полноволосый с развившимися остью и пухом | Полноволосый с частой остью и густым пухом | Полноволосый с шелковистым ровным густым пухом |
| Второй | Менее полноволосый с недоразвившимися остью и пухом | С менее частой остью и редковатым пухом | Пух менее густой |
| Третий | Полуволосый с низкими остью и пухом | — | — |

1.10. В зависимости от пороков шкурки кролика подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование порока | Группа порока | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
| 1. Швы общей длиной к длине шкурки | До 0,50 | Св. 0,50 до 1,00 | Св. 1,00 до 1,50 | Св. 1,50 до 2,00 |
| 2. Плешины, дыры, вытертые места, закусы, групповые засечки на стриженых шкурках общей площадью, % | До 1,00 | Св. 1,00 до 5,00 | Св. 5,00 до 10,00 | Св. 10,00 до 15,00 |
| 3. Деформированный волос, сквозной волос, битость ости общей площадью, % | Не допускаются | До 5,00 | Св. 5,00 до 10,00 | Св. 10,00 до 15,00 |
| 4. Поредение волосяного покрова на череве и боках общей площадью, % | До 15,00 | Св. 15,00 до 25,00 | Св. 25,00 до 40,00 | Св. 40,00 до 60,00 |
| 5. Наличие заметной ости на стриженых шкурках с удаленной остью общей площадью, % | До 10,00 | Св. 10,00 до 20,00 | — | — |

Примечания:

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2—5, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

2. При наличии на шкурках неудаленной ости более чем на 20% площади шкурки их относят к стриженым.

3. Пороки, расположенные до 1 см от края шкурки, не учитывают.

1.11. На шкурках не допускается более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «вторая» более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «третья» более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» более двух различных пороков группы «третья», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех пороков группы «вторая».

1.12. Оценку качества шкурок кролика производят в соответствии с приложением.

1.13—1.16. **(Исключены, Изм. № 2).**

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.2, 2.3. **(Исключены, Изм. № 1).**

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение температуры сваривания кожевой ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.3. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129—84.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.5. Определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.6. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.7, 3.8. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.9. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

3.10. Площадь каждой шкурки определяют умножением ее длины, измеряемой миллиметровой линейкой от середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую посередине шкурки, и выражают в квадратных дециметрах.

3.11. Высоту стрижки волосяного покрова измеряют миллиметровой линейкой, установленной нулевым делением на кожевой ткани у корня волос.

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки кролика должны быть нанесены условные цифровые обозначения характеристики качества.

Условные обозначения:

| по сортам: | по группам пороков: |
|---|---|
| первый — 1; | первая — 1; |
| второй — 2; | вторая — 2; |
| третий — 3; | третья — 3; |
| | четвертая — 4. |

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

### ТАБЛИЦА

**оценки качества выделанных меховых шкурок кролика в процентах**

| Сорт | Группа порока | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
| Первый | 100,00 | 85,00 | 70,00 | 45,00 |
| Второй | 75,00 | 63,75 | 52,50 | 33,75 |
| Третий | 60,00 | 51,00 | 42,00 | 27,00 |

Примечание. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта первой группы пороков.

gost.e-ecolog.ru