13056.1-67
13056.3-86
13056.4-67
13056.5-76
13056.6-75
13056.8-68
13056.9-68
13056.10-68
13056.11-68

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СЕМЕНА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН

ГОСТ 13056.1—67, ГОСТ 13056.2—67,89
ГОСТ 13056.3—86, ГОСТ 13056.4—67,
ГОСТ 13056.5—76, ГОСТ 13056.6—75,
ГОСТ 13056.7-68—ГОСТ 13056.11-68

93

Издание официальное

Цена 60 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СЕМЕНА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН

ГОСТ 13056.1—67, ГОСТ 13056.2—67,
ГОСТ 13056.3—86, ГОСТ 13056.4—67,
ГОСТ 13056.5—76, ГОСТ 13056.6—75,
ГОСТ 13056.7-68—ГОСТ 13056.11-68

Издание официальное

МОСКВА—1988

УДК 634.956.2:006.354 Группа С99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Семена деревьев и кустарников.

ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Seed of trees and shrubs.
Sampling

ГОСТ 13056.1—67*

Взамен
ГОСТ 2937—55
в части разд. I, II и III

ОКСТУ 9709

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июля 1967. Срок введения установлен

с 01.07.68

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.07.85 № 2158 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена деревьев и кустарников, предназначенные для посева, и устанавливает методы отбора образцов.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Качество партии семян устанавливают на основании анализа отобранного от нее среднего образца.

1.2. Партией семян считают определенное по массе количество однородных семян одного вида или разновидности, удостоверенное паспортом и этикеткой (приложения 2, 3).

Однородной считают партию, семена которой:

а) собраны в однородных условиях местопроизрастания (одной группы типов леса), на одинаковой высоте над уровнем моря и склоне одной экспозиции (в горных условиях), в пределах одной возрастной группы (молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые), на одной лесосеменной плантации или лесосеменном участке;

б) заготовлены в насаждениях одного происхождения (естественного или искусственного);

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1976 г., июле 1985 г. (ИУС 3—76, 10—85).*

3-V-90

в) одинаковы по лесоводственной ценности (отборные, улучшенные или нормальные);

г) одинаковы по времени (сезону) сбора;

д) одинаковы по способам сбора, обработке плодов и семян;

е) одинаковы по сроку извлечения семян из шишек (не более двух недель работы шишкосушилки);

ж) хранятся в одинаковых условиях (один вид тары, склад);

з) одинаковы по цвету, блеску, запаху, степени влажности и поврежденности.

1.3. Выемка — небольшое количество семян, отбираемых от партии за один прием для составления исходного образца.

1.4. Исходный образец — совокупность всех выемок, отобранных от партии семян.

1.5. Средний образец — часть семян исходного образца, выделенная из него для лабораторного анализа.

1.6. Навеска — часть семян среднего образца, выделенная из него для определения отдельных показателей качества семян

1.7. Средние образцы для определения качества семян отбирают от вполне подготовленных партий семян, т. е. очищенных, просушенных, взвешенных, пронумерованных и имеющих паспорт и этикетку установленной формы.

1.8. Отбор средних образцов производят лесничие, помощники лесничих, инженеры, агрономы и другие специалисты хозяйств (организаций), специально уполномоченные по отбору образцов и прошедшие соответствующий инструктаж на лесосеменной станции.

1.9. Отбор средних образцов производят при участии представителя хозяйства (организации) и лица, ответственного за хранение семян.

1.10. Средние образцы для первой проверки отбирают не позднее 10 дней после окончания формирования партии семян, для ильмовых пород — не позднее трех дней.

1.11. Средние образцы для повторной проверки отбирают за месяц до истечения срока действия удостоверения о кондиционности семян.

Примечание. В необходимых случаях при закладке семян собственной заготовки на длительное хранение допускается проверка семян до истечения срока действия удостоверения о кондиционности.

1.12. Отбор средних образцов в порядке государственного контроля производят представители лесосеменной станции.

1.13. Отбор средних образцов для арбитражного определения качества семян производят представители организации — отправителя и организации — получателя семян, уполномоченные по отбору средних образцов. В случае невыезда представителя организации — отправителя отбор средних образцов для арбитражного определения качества семян производят представители лесосе-

менных станций или в исключительных случаях представители государственных семенных инспекций Госагропрома СССР в присутствии представителя организации — получателя семян.

1.14. Руководители хозяйств и организаций обязаны обеспечить условия для правильного отбора образцов семян, а также предъявить лицам, отбирающим образцы, документы о количестве и качестве семян.

1.15. Отбор средних образцов оформляют актом по установленной форме (приложение 4). Гарантию о соблюдении правильных условий хранения партии семян, о сохранности партии семян от смешения и засорения подписывают в акте руководитель хозяйства (организации) и лицо, ответственное за хранение данной партии семян. Акт составляют в трех экземплярах: один оставляют в хозяйстве, где хранятся семена; второй одновременно со средним образцом отсылают на лесосеменную станцию; третий передают бухгалтерии для списания расхода семян на производство анализа.

1.16. Средний образец семян должен быть отправлен на лесосеменную станцию с актом и копией паспорта в течение не более двух суток со времени его отбора.

1.17. Масса партии, от которой отбирают один средний образец, и масса образца по породам указаны в приложении 1.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

2а.1. Аппаратура и материалы

Для отбора образцов применяют:

щупы конусные, цилиндрические, мешочные и специальные щупы для бутылей;

емкости для объединения отдельных выемок и составления исходного образца;

весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 10 кг по ГОСТ 24104—80;

набор гирь по ГОСТ 7328—82;

деревянные планки или линейки;

совки;

мешки для средних образцов разной вместимости из ткани по ГОСТ 7138—83;

мешки из влагонепроницаемой пленки вместимостью 0,5 дм³ и более;

посуду стеклянную вместимостью 0,25 дм³ и более;

сургуч;

парафин по ГОСТ 23683—79;

воск по ГОСТ 21179—75;

пломбир;


пломбы по ГОСТ 18677—73;
нитки по ГОСТ 6309—80;
шпагат по ГОСТ 17308—85;
клей.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.1. Отбор выемок

2.1.1. Отбор выемок производят щупом или рукой в зависимости от породы и условий хранения семян.

2.1.2. От партий мелких и средних семян, хранящихся насыпью, выемки отбирают конусным или цилиндрическим щупом (черт. 1 *а, в*) или руками из пяти мест каждого слоя насыпи (в верхнем — на глубине 10 см, в среднем — на глубине, равной половине высоты насыпи, и в нижнем — у пола), т. е. не менее 15 выемок.



Щупы: *а*—конусный; *б* - мешочный; *в*—цилиндрический

Черт 1

От партий крупных семян (орехов, плодовых косточковых пород и др.) выемки отбирают руками из десяти мест каждого слоя (верхнего, среднего и нижнего), т. е. не менее 30 выемок.

2.1.3. От партий сыпучих семян, хранящихся в зашитых мешках, выемки отбирают мешочным щупом (черт. 1*б*) с последующей заделкой проколов в мешке. Из незашитых мешков выемки отбирают руками, цилиндрическим или конусным щупом.

Отбор выемок производят в следующем порядке:

а) от партии семян до 10 мешков включительно — из каждого мешка не менее трех выемок (по одной из верхнего, среднего и нижнего слоя);

б) от партии семян более 10 мешков — из каждого мешка не менее двух выемок, чередуя места их взятия. При отборе выемок мешочным щупом последний вводят в мешок желобком вниз и только после введения всего щупа в семена его переворачивают желобком вверх.

2.1.4. Отбор выемок от партий сыпучих семян, хранящихся в стеклянных бутылях и металлических сосудах, а также от партий малосыпучих семян в мешках, ящиках и другой таре, производят руками. Для этого семена высыпают на гладкую поверхность, тщательно перемешивают, разравнивают их и отбирают ру-

ками из разных мест не менее пяти выемок от каждого места тары.

2.1.5. Из разных мест партии желудей отбирают при предварительном осеннем хранении, а также весной перед посевом не менее 15 выемок.

2.2. Составление исходного образца

2.2.1. Отобранные от каждой партии выемки семян высыпают (по отдельности) на гладкую поверхность, тщательно просматривают и сравнивают по засоренности, запаху, цвету, блеску и другим признакам для установления однородности. При отсутствии резких различий выемки объединяют для составления исходного образца.

Примечания:

1. Масса исходного образца должна быть не менее десятикратной массы среднего образца.

2. От малых партий семян отбирают средние образцы половинной массы (приложение 1, примечания 1, 2) без составления исходного образца

2.2.2. В случае резкого отличия отдельных выемок, указывающего на неоднородность партии семян, исходные образцы составляют по однородным выемкам с соответствующим разделением в натуре партии на части. Каждая выделенная часть однородных семян оформляется как отдельная партия.

При невозможности выделения такой части партии из основной массы образцы отбирают после дополнительной обработки всей партии семян.

2.3. Составление среднего образца

2.3.1. Из исходного образца выделяют один средний образец для определения чистоты, массы 1000 семян, энергии прорастания, всхожести (жизнеспособности, доброкачественности), зараженности семян грибными болезнями и повреждения их вредителями.

2.3.2. При необходимости определения влажности семян из остатка исходного образца выделяют второй средний образец по ГОСТ 13056.3—86.


2.3.3. Средний образец семян выделяют из исходного образца способом крестообразного деления (черт. 2).

Семена исходного образца высыпают на гладкую поверхность, тщательно перемешивают, разравнивают в виде квадрата толщиной до 3 см для мелких семян и не более 10 см для крупных семян, а затем делят по диагонали на четыре треугольника.

Из двух противоположных треугольников семена удаляют, а из двух оставшихся объединяют для последующего деления до тех пор, пока в двух противоположных треугольниках останется количество семян, необходимое для получения среднего образца установленной массы.

Образец для определения влажности семян составляют таким же образом из остатка семян исходного образца.

2.3.4. Отобранный средний образец, предназначенный для определения чистоты семян, массы 1000 семян, энергии прорастания, всхожести (жизнеспособности, доброкачественности) помещают в чистый мешочек из плотной ткани, предварительно продезинфицированный кипячением в воде. Мешочек со средним образцом и вложенной в него этикеткой завязывают шпагатом. Средние образцы, отобранные для арбитража или госконтроля, должны быть опломбированы или опечатаны. Госконтрольные образцы опечатывают печатью лесосеменной станции.



Черт. 2

2.3.5. Средний образец, предназначенный для определения влажности, помещают в чистую, сухую стеклянную посуду, которую после заполнения доверху семенами плотно закупоривают пробкой и заливают сургучом, воском или парафином.

Допускается помещать средний образец семян в мешок вместимостью не менее 0,5 дм³ из влагонепроницаемой пленки. Края мешка из влагонепроницаемой пленки закрывают горячим способом или крепко связывают, оставляя в нем как можно меньше воздуха, а затем помещают во второй такой же мешок, который туго завязывают.

Один экземпляр этикетки вкладывают вовнутрь посуды или мешка, другой наклеивают снаружи.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3.6. Отобранные образцы семян до момента отправки их на лесосеменную станцию должны находиться на складе, где хранятся партии семян.

3. ПРИЕМ СРЕДНИХ ОБРАЗЦОВ НА АНАЛИЗ И ИХ ХРАНЕНИЕ

3.1. Средние образцы семян и сопроводительные документы к ним высылают лесосеменной станции в деревянных фанерных ящиках или другой прочной таре.

На каждом мешочке со средним образцом указывают видовое название породы, массу партии и номер паспорта.

3.2. Лесосеменная станция, принимая образцы на анализ, проверяет:

а) целостность мешочков или стеклянной посуды, в которые упакованы образцы, а также пломб или печатей на арбитражных и госконтрольных образцах;

б) наличие необходимых сопроводительных документов (акта отбора образцов с подписью уполномоченного, этикеток, копии паспорта, а при поверочном, арбитражном и повторном анализах — копии документа о качестве семян);

Примечание. При повторном анализе копию документа о качестве высылают тогда, когда первая проверка осуществлялась другой лесосеменной станцией;

в) правильность оформления акта отбора, этикетки, копии паспорта и копии документа о качестве семян;

г) наличие акта о дополнительной очистке семян при повторном анализе (приложение 5);

д) своевременность поступления в лесосеменную станцию отобранных образцов;

е) соответствие видового названия породы, указанного в сопроводительных документах семенам в представленном образце;

ж) соответствие массы партий и массы отобранных образцов установленным размерам.

3.3. Средние образцы, представленные без соблюдения перечисленных требований, на анализ не принимают. Лесосеменная станция в трехдневный срок извещает хозяйство (организацию) о причине возврата образцов.

Не подлежат приему на анализ средние образцы:

а) в случае явного смешения семян двух или более видов;

б) в сочных подвяленных плодах.

3.4. Принятые средние образцы взвешивают. Допускается прием средних образцов с отклонением от установленной массы $\pm 5\%$.

3.5. Принятые средние образцы регистрируют в день поступления в журнале установленной формы, начиная с 1 января и кончая 31 декабря каждого года.

Номера зарегистрированных образцов проставляют на мешочке или стеклянной посуде со средним образцом и на всех документах, относящихся к данному образцу.

3.6. Остатки средних образцов стандартных семян хранят на лесосеменной станции не менее срока действия удостоверения о кондиционности семян, выданного на данную партию.

Остатки образцов нестандартных семян хранят на станции в течение срока действия удостоверения о кондиционности семян, принятого для семян низкого качества.

3.7. Остатки средних образцов по истечении срока их хранения обезличивают.

3.8. Обезличивание остатков средних образцов семян производят в соответствии с инструкцией, утвержденной Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
1. Абрикос маньчжурский Armeniaca manshurica (Maxim.) Skvortz.	500	2000
2. Абрикос обыкновенный Armeniaca vulgaris Lam.	500	2500
3. Абрикос сибирский Armeniaca sibirica (L.) Lam.	500	2000
4. Айва продолговатая или обыкновенная Cydonia oblonga Mill.	200	200
5. Айлант высочайший, айлант (китайский ясень) Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.	200	300
6. Акантопанакс сидячецветковый Acanthopanax sessiliflorum (Rupr. et Maxim.) Seem.	50	75
7. Акация серебристая или мимоза серебристая Acacia dealbata Link	100	150
8. Актинидия коломикта Actinidia kolomikta (Rupr.) Maxim.	30	25
9. Актинидия острая Actinidia arguta (Sied. et Zucc.) Planch.	30	25
10. Альбиция ленкоранская или шелковая акация Albizzia julibrissin Durazz	200	300
11. Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa L.	100	100
12. Аммодендрон Коноллн (акация песчаная) Ammodendron Conollyi Bge.	200	300
13. Аралия маньчжурская, чертово дерево или шип-дерево Aralia mandshurica Rupr. et Maxim.	30	25
14. Арония черноплодная Arania melanocarpa (Michx.) Elliot	50	50
15. Багрянник китайский Cercidiphyllum sinense Rehd. et Wils.	200	300
16. Багрянник японский Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.	100	150
17. Барбарис амурский Berberis amurensis Rupr.	100	100
18. Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L.	100	100
19. Бархат амурский Phellodendron amurense Rupr.	100	100

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
20. Бархат сахалинский Phellodendron sachalinence (Fr. Schmidt) Sarg.	75	75
21. Береза белая китайская Betula albo-sinensis Burk.	30	25
22. Береза бородавчатая Betula verrucosa Ehrh.	75	25
23. Береза бумажная Betula papyrifera Marsh.	30	25
24. Береза граболистная Betula grossa Sieb. et Zucc.	30	25
25. Береза даурская или черная дальневосточная Betula dahurica Pall.	30	25
26. Береза пушистая Betula pubescens Ehrh.	75	25
27. Береза ребристая или желтая дальневосточная Betula costata Trautv.	30	25
28. Береза Шмидта или железная Betula Schmidtii Rgl.	30	25
29. Береза Эрмана или каменная Betula Ermani Cham.	30	25
30. Бересклет большекрылый Euonymus macroptera Rupr.	200	300
31. Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosa Scop.	100	150
32. Бересклет европейский Euonymus europaea L.	200	300
33. Бересклет крылатый Euonymus alata (Thunb.) Sieb.	100	150
34. Бересклет Маака Euonymus Maackii Rupr.	100	200
35. Бересклет малоцветковый Euonymus pauciflora Maxim.	100	150
36. Бересклет сахалинский Euonymus sachalinensis (Fr. Schmidt) Maxim.	100	200
37. Бересклет японский Euonymus japonica L. f.	200	300
38. Биота восточная Biota orientalis Endl.	100	150
39. Бирючина блестящая Ligustrum lucidum Ait.	100	150
40. Бирючина китайская Ligustrum sinense Lour	100	100
41. Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare L.	100	200
42. Бирючина овальнолистная Ligustrum ovalifolium Hassk.	75	100

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
43. Бирючина японская Ligustrum japonicum Thunb.	100	150
44. Бобовник анагиролистный или золотой дождь (ракитник золотой дождь) Laburnum anagyroides Medic.	100	200
45. Болотный кипарис обыкновенный Taxodium distichum (L.) Rich.	200	500
46. Боярышник вееровидный Crataegus flabellata (Bosc.) C. Koch	100	400
47. Боярышник даурский Crataegus dahurica Koehne	100	200
48. Боярышник кавказский Crataegus caucasica C. Koch	100	200
49. Боярышник колючий или обыкновенный Crataegus exyacantha L.	100	300
50. Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall.	100	200
51. Боярышник однопестичный Crataegus monogyna Jacq.	100	500
52. Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatifida Bge.	100	400
53. Боярышник понтийский Crataegus pontica C. Koch	100	400
54. Боярышник согнутостолбиковый Crataegus kyrtostyla Fingerh.	100	400
55. Бузина кистистая, обыкновенная (бузина красная) Sambucus racemosa L.	30	25
56. Бузина черная Sambucus nigra L.	50	50
57. Бук восточный Fagus orientalis Lipsky	500	1500
57а. Бук крымский Fagus taurica Popl.	500	1500
58. Бук лесной или европейский Fagus silvatica L.	500	1500
59. Вашингтония витеносная Waschingtonia filifera (Linden) H. Wendl.	100	200
60. Виноград амурский Vitis amurensis Rupr.	100	200
61. Вишня Бессея Cerasus Besseyi (Bailey) comb. nova	300	500
62. Вишня войлочная Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.	200	400
63. Вишня карликовая Cerasus pumila (L.) comb. nova	400	750

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
64. Вишня кустарниковая, вишарник (вишня степная) Cerasus fruticosa (Pall.) G. Woron.	200	400
65. Вишня (культурные сорта)	400	750
66. Вишня обыкновенная Cerasus vulgaris Mill.	400	500
67. Вишня серая Cerasus canescens (D. Bois) comb. nova	200	300
68. Вишня японская Cerasus japonica (Thunb.) Lois.	300	500
69. Вяз гладкий Ulmus laevis Pall.	100	50
70. Вяз листоватый, берест или карагач Ulmus foliacea Gilib.	100	100
71. Вяз мелколистный Ulmus parvifolia Jacq	100	75
72. Вяз перистоветвистый, туркестанский карагач Ulmus pinnato — ramosa Dieck.	100	75
73. Вяз приземистый или альмовник Ulmus pumila L.	100	75
74. Вяз шершавый или горный ильм Ulmus scabra Mill.	100	100
75. Гибискус изменчивый Hibiscus mutabilis L.	50	50
76. Гибискус сирийский Hibiscus syriacus L.	100	100
77. Гинкго двулопастный Ginkgo biloba Z.	500	1500
78. Гледичия обыкновенная Gleditschia triacanthos L.	400	500
79. Гордовина Viburnum lantana L.	200	300
80. Граб восточный, грабинник Carpinus orientalis Mill.	75	75
81. Граб обыкновенный Carpinus betulus L.	200	300
82. Груша иволистная Pyrus salicifolia Pall.	200	300
83. Груша обыкновенная Pyrus communis L.	100	150
84. Груша уссурийская Pyrus ussuriensis Maxim.	200	300
85. Дейция шершавая Deutzia scabra Thunb.	30	15
86 Дерен белый Cornus alba L.	200	200
87. Дерен кроваво-красный или свидина Cornus sanguinea L.	200	300

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
88. Дерен мужской или кизил Cornus mas L.	400	1000
89. Держи-дерево, Христовы терни Paliurus spina Christi Mill.	100	750
90. Джузгун безлистный Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke	200	300
91 Джузгун голова Медузы Calligonum caput Medusae Schrenk.	200	500
92 Джузгун древовидный Calligonum arborescens Litw.	400	750
93. Джузгун туркестанский Calligonum turkestanicum (Eug. Kor.) N. Pavl.	200	300
94. Джузгун шерстистоногий Calligonum eriopodum Bge.	200	300
95. Джузгун щетинистый Calligonum setosum Litw.	300	500
96. Дзельква граболистная Zelkowa carpinifolia (Pall) Dipp.	100	150
97. Дрок испанский Genista hispanica L.	100	100
98. Дрок красильный Genista tinctoria L.	50	50
99. Дуб красный Quercus rubra L.	1000	2500
100. Дуб крупнопыльниковый Quercus macranthera Fisch. et Mey.	1000	2500
101 Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch.	1000	2500
102. Дуб пробковый Quercus suber L.	1000	2500
103. Дуб скальный или сидячецветный Quercus petraea Liebl.	1000	2500
104. Дуб черешчатый Quercus robur L.	5000	2500
105. Ель аянская Picea jezoensis Carr.	50	25
106. Ель восточная Picea orientalis (L.) Link.	50	75
107. Ель Глена Picea Glehni Mast.	50	25
108. Ель колючая Picea pungens Engelm.	50	30
109. Ель корейская Picea koraiensis Nakai.	50	50
110. Ель сербская Picea omorica Purk.	50	30

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
111. Ель сибирская Picea obovata Ldb.	50	50
112. Ель обыкновенная или европейская Picea excelsa Link.	50	50
113. Ель тяньшанская Picea tianschnica Rupr	50	75
113а. Ель Шренка Picea Schrenkiana F. et. M.	50	75
114. Ель Энгельмана Picea Engelmanii Engelm.	50	75
115. Жариовец метельчатый Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.	75	50
116. Жестер слабительный (крушина слабительная) Rhamnus cathartica L.	100	150
117. Жимолость Маака Lonicera Maackii Maxim.	75	50
118. Жимолость Максимовича Lonicera Maximowiczii Rgl.	75	50
119. Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L.	50	50
120. Жимолость Рупрехта Lonicera Ruprechtiana Rgl.	50	30
121. Жимолость синяя Lonicera caerulea L.	30	25
122. Жимолость съедобная Lonicera edulis Turcz. ex Freyn.	30	25
123. Жимолость татарская Lonicera tatarica L.	50	50
124. Земляничное дерево крупноплодное Arbutus unedo L.	50	30
125. Зопник кустарниковый Phlomis fruticosa L.	50	50
126. Ива Salix L.	30	25
127. Инжир, фиговое дерево Ficus carica L.	30	25
128. Ирга канадская Amelanchier canadensis (L.) Medic.	75	50
129. Ирга круглолистная Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. — Cours.	75	50
130. Калина буреинская Viburnum burejaeticum Rgl. et Herd.	200	300
131. Калина лавролистная Viburnum tinus L.	200	200
132. Калина обыкновенная Viburnum opulus L.	200	150
133. Калина Сарджента Viburnum Sargenti Koehne	200	300

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
134. Калопанакс семилопастный, диморфант или белый орех Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koldz.	50	30
135. Кампсис укореняющийся Campsis radicans (L.) Seem.	50	50
136. Карагана древовидная или желтая акация Caragana arborescens Lam.	100	200
137. Каркас западный Celtis occidentalis L.	400	750
138. Каркас кавказский Celtis caucasica Willd.	500	1500
139. Кария пекан Carya pecan (Marsh.) Engl. et Graebn.	1000	2500
140. Катальпа бигнониевидная (катальпа обыкновенная) Catalpa bignonioides Walt.	100	100
141. Катальпа прекрасная Catalpa speciosa Ward.	100	100
142. Каштан посевной, европейский или благородный Castanea sativa Mill.	2000	3500
143. Кедр атласский Cedrus atlantica Manetti	200	300
144. Кедр гималайский Cedrus deodara Loud	200	300
145. Кедр ливанский Cedrus libani Laws.	200	300
146. Кедровый стланик Pinus pumila (Pall.) Rgl.	200	500
147. Кельрейтерия метельчатая (мыльное дерево) Koelreuteria paniculata Laxm.	200	750
148. Кизильник блестящий Cotoneaster lucida Schlecht.	100	200
149. Кизильник Генри Cotoneaster Henryana (C. K. Schneid.) Rehd. et Wils.	75	100
150. Кизильник цельнокрайний Cotoneaster integerrima Medic.	100	200
151. Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpa Lodd.	100	150
152. Кипарис аризонский Cupressus arizonica Greene	75	50
153. Кипарис вечнозеленый Cupressus sempervirens L.	75	50
154 Кипарис Говена или калифорнийский Cupressus Goveniana Gord.	75	50
155. Кипарис крупноплодный Cupressus macrocarpa Hartw.	100	100

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
156. Кипарис лузитанский Cupressus lusitanica Mill.	50	25
157. Кипарис надутый или гималайский Cupressus torulosa D. Don.	50	50
158. Кипарис плакучий Cupressus funebris Endl.	50	30
159. Кипарисовик горохоплодный Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc.	30	25
160. Кипарисовик Лавсона Chamaecyparis Lawsoniana (Andr.) Parl.	50	25
161. Клекачка перистая Staphylea pinnata L.	500	1500
162. Клен бархатистый или величественный Acer velutinum Boiss.	300	500
163. Клен бородатый Acer barbinerve Maxim.	200	300
164. Клен гиннала или приречный Acer ginnala Maxim.	100	200
165. Клен желтый Acer ukurunduense Trautv. et Mey.	100	100
166. Клен зеленокорый Acer tegmentosum Maxim.	200	300
167. Клен ложноплатановый, явор, белый клен Acer pseudoplatanus L.	300	500
168. Клен маньчжурский Acer mandschuricum Maxim.	200	300
169. Клен мопо или мелколистный Acer mono Maxim.	200	300
170 Клен монпелийский или трехлопастный Acer monspessulanum L.	200	300
171. Клен остролистный или платановидный Acer platanoides L.	300	500
172. Клен полевой Acer campestre L.	200	300
173. Клен Семенова Acer Semenovii Rgl. et Herd.	200	300
174 Клен серебристый Acer saccharinum L.	300	500
175. Клен татарский, неклен, черноклен Acer tataricum L.	200	300
176. Клен Траутфеттера Acer Trautvetteri Medw.	400	750
177. Клен ясенелистный или американский Acer negundo L.	200	300
178. Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum L.	2000	6000
179. Конфетное дерево сладкое Howenia dulcis Thunb.	50	75

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
180. Кордилина южная Cordyline australis Hook. f.	50	25
181. Коричник камфорный или камфорный лавр Cinnamomum camphora (L.) Nees et Eberm.	200	200
182. Криптомерия японская Cryptomeria japónica Don.	50	25
183. Крыжовник Grossularia Mill.	50	30
184. Крушина ольховидная или ломкая Frangula alnus Mill.	100	200
185. Лагерстремия индийская Lagerstroemia indica L.	30	30
186. Лавр благородный Laurus nobilis L.	500	1000
187. Лавровишня лекарственная Laurocerasus officinalis Roem.	300	400
188. Лавровишня лузитанская Laurocerasus lusitanica (L.) Roem.	200	300
189. Ладанник белый Cistus albidus L.	30	25
190 Лапина крылоплодная Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth.	200	400
191. Лespедеца двуцветная Lespedeza bicolor Turcz.	75	75
192. Лещина древовидная или медвежий орешник Corylus colurna L.	500	2500
193. Лещина маньчжурская Corylus mandshurica Maxim.	500	2000
194. Лещина обыкновенная Corylus avellana L.	500	2500
195. Лещина разнолистная Corylus heterophylla Fisch.	500	2500
195а. Лжетсуга сизая Pseudotsuga glauca Mayr.	100	100
196. Лжетсуга тиссолистная Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.	100	100
197. Ликвидамбар смолоносный или амбровое дерево Liquidambar styraciflua L.	75	50
198. Лимонник китайский Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.	100	150
199. Липа амурская Tilia amurensis Rupr.	200	300
200. Липа войлочная или венгерская Tilia tomentosa Moench	200	500
201. Липа кавказская Tilia caucasia Rupr.	200	500

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
202. Липа крымская Tilia euchlora C. Koch.	200	500
203. Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop.	300	500
204. Липа маньчжурская Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.	200	750
205. Липа мелколистная или сердцевидная Tilia cordata Mill.	200	300
206. Лириодендрон тюльпанный или тюльпанное дерево Liriodendron tulipifera L.	100	200
206а. Лиственница амурская Larix amurensis Kolesn	50	50
207. Лиственница Гмелина Larix Gmelinii (Rupr.) Carr.	50	50
208. Лиственница европейская Larix decidua Mill.	50	50
208а. Лиственница Каяндера Larix Cajanderi Mayr.	50	50
208б. Лиственница Комарова Larix Komarovii Kolesn.	50	50
208в. Лиственница курильская Larix kurilensis Mayr.	50	50
208г. Лиственница Любарского Larix Lubarskii Sukacz.	50	50
208д. Лиственница ольгинская Larix olgensis A. Henzy	50	75
208е. Лиственница охотская Larix ochotensis Kolesn.	50	50
208ж. Лиственница польская Larix polonica Racib.	50	50
208з. Лиственница приморская Larix maritima Sukacz.	50	75
209. Лиственница сибирская Larix sibirica Ldb.	50	75
210. Лиственница Сукачева Larix Sukaczewii Dyl. spec nov.	50	100
210а. Лиственница Чекановского Larix Czekanovskii Szaf.	50	75
211. Лиственница японская Larix leptolepis Gord.	50	50
212. Лох восточный Elaeagnus orientalis L.	500	1500
213. Лох колючий Elaeagnus pungens Thunb.	200	500
214. Лох серебристый Elaeagnus argentea Pursh.	200	500

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
215. Лох узколистный Elaeagnus angustifolia L.	200	500
216. Луносемянник даурский Menispermum dahuricum DC.	200	500
217. Маакия амурская (Акация амурская) Maackia amurensis Rupr. et Maxim.	200	400
218. Магнолия крупноцветковая Magnolia grandiflora L.	200	500
219. Магония падуболистная Mahonia aquifolium Nutt.	75	100
220. Магония японская Mahonia japonica (Thunb.) DC	100	150
221. Маклюра оранжевая Maclura aurantiaca Nutt.	200	300
222. Миндаль бухарский Amygdalus bucharica Korsh.	500	2000
223. Миндаль низкий, степной миндаль, бобовник Amygdalus nana L.	500	2000
224. Миндаль обыкновенный Amygdalus communis L.	1000	2500
225. Мирт обыкновенный Myrtus communis L.	75	50
226. Можжевельник виргинский Juniperus virginiana L.	100	200
227. Можжевельник высокий Juniperus excelsa M. B.	100	200
228. Можжевельник красный Juniperus oxycedrus L.	100	200
229. Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L.	100	150
230. Мушмула германская Mespilus germanica L.	200	400
231. Облепиха крушиновая Hippophaë rhamnoides L.	100	150
231а. Олеандр обыкновенный Nerium oleander L.	30	25
232. Ольха пушистая Alnus hirsuta Turcz.	30	25
233. Ольха серая или белая Alnus incana (L.) Moench.	30	25
234. Ольха черная или клейкая Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	30	25
235. Орех грецкий Juglans regia L.	1000	5500
236. Орех Зимбольда Juglans Sieboldiana Maxim.	500	3500
237 Орех маньчжурский Juglans manshurica Maxim.	1000	4500

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
238. Орех серый Juglans cinerea L.	500	5500
239. Орех черный Juglans nigra L.	500	6500
240. Осина Populus tremula L.	30	15
241. Османтус пахучий или душистая маслина Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.	200	750
242. Павловния войлочная Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.	30	15
243. Паркинсония колючая Parkinsonia aculeata L.	200	500
244. Парротия персидская, железное дерево, бокаут Parrotia persica (DC) C.A.M.	100	150
245. Персик обыкновенный Persica vulgaris Mill.	1000	2500
246. Питтоспорум (смолосемянник) тобира Pittosporum tobira Dryand.	100	200
247. Пихта алжирская Abies numidica De Lannoy	100	500
248. Пихта бальзамическая Abies balsamea Mill.	75	75
249. Пихта белая, европейская или гребенчатая Abies alba Mill.	200	400
250. Пихта белокорая или почкочешуйная Abies nephrolepis Maxim.	75	75
251. Пихта греческая Abies cephalonica Loud.	100	400
252. Пихта камчатская или тонкая Abies gracilis Kom	75	50
253. Пихта Нордманна или кавказская Abies Nordmanniana (Stev.) Spach.	100	400
254. Пихта сахалинская Abies sachalinensis Mast.	75	75
255 Пихта сибирская Abies sibirica Ldb.	100	100
256. Пихта цельнолистная Abies holophylla Maxim	100	200
257. Платан восточный Platanus orientalis L.	50	50
258. Платан западный Platanus occidentalis L.	50	50
259. Платан кленолистный Platanus acerifolia Willd.	50	30
260 Платикария шишконосная Platycaria strobilacea Sieb. et Zucc.	50	50

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
261. Понцирус трехлисточковый Poncirus trifoliata (L.) Raf	200	500
262. Принсепия китайская (плоскосемянник) Prinsepia sinensis (Oliv.) Kom.	100	1000
263. Птелея трехлистная (вязовик) Ptelea trifoliata L.	200	300
264. Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.	30	25
265. Пузырник древовидный (пузырник обыкновенный) Colutea arborescens L.	100	150
266. Ракитник регенсбургский (ракитник двуцветковый) Cytisus ratisbonensis Schaeff.	75	100
266а. Ракитник чернеющий Cytisus nigricans L.	100	75
267. Речной кедр сбежистый или калифорнийский Libocedrus decurrens Torr.	100	150
268. Робиния лжеакация или белая акация Robinia pseudoacacia L.	100	150
269. Роза даурская Rosa davurica Pall.	75	100
270. Роза иглистая Rosa acicularis Lindl.	75	100
271. Роза коричневая Rosa cinnamomea L.	100	100
272. Роза морщинистая Rosa rugosa Thunb.	75	100
273 Роза собачья Rosa canina L.	100	150
274. Роза яблочная Rosa pomifera Herrm.	75	75
275. Рябина амурская Sorbus amurensis Koehne.	30	30
276. Рябина глоговина, берека лечебная Sorbus torminalis (L.) Crantz	100	200
277. Рябина домашняя Sorbus domestica L.	100	200
278. Рябина камчатская Sorbus kamtschatcensis Kom.	50	25
279. Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.	50	25
280. Рябина промежуточная Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.	100	150
281. Саксаул белый, песчаный Haloxylon-persicum Bge.	500	50
282. Саксаул черный, солончаковый, безлистный Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin.	500	50

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
283. Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens L.	50	100
284. Свободноягодник колючий или дикий перец (элеутерококк) Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim.	50	50
285. Секвойя вечнозеленая Seguoia sempervirens Endl.	50	25
286. Секвойя гигантская Seguoia giganteum Lindl.	50	50
287. Секуринега полукустарниковая Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.	50	50
288. Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L.	75	50
289. Скумпия или желтинник Cotinus coggygria Scop.	75	75
290. Слива домашняя Prunus domestica L.	500	2000
291. Слива колючая, тери Prunus spinosa L.	400	750
292. Слива (алыча) растопыренная Prunus divaricata Ldb.	500	1500
293. Слива уссурийская Prunus ussuriensis Kov. et. Kost.	500	1500
294. Смирновия туркестанская Smirnovia turkestana Bge.	100	200
295. Смородина золотая Ribes aureum Pursh	30	30
296. Смородина красная Ribes rubrum L.	50	30
297. Смородина черная Ribes nigrum L.	30	25
298. Снежноягодник белый или кистевой Sumphoricarpos albus (L.) Blake	75	100
299. Солянка Палецкого, кара-черкез (черкез Палецкого) Salsola Paletzkiana Litw.	500	100
300. Солянка Рихтера, черкез, геок-черкез (черкез Рихтера) Salsola Richteri Karel.	500	100
301. Сосна алеппская Pinus halepensis Mill.	100	150
302. Сосна Банкса Pinus Banksiana Lamb.	50	50
303. Сосна веймутова Pinus strobus L.	100	150
304. Сосна густоцветная Pinus densiflora Sieb. et Zucc.	100	100

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
305. Сосна горная Pinus montana Mill.	75	100
306. Сосна замечательная (сосна величественная) Pinus radiata Don.	200	300
307. Сосна итальянская, пиния Pinus pinea L.	500	2000
308. Сосна кедровая сибирская, кедр сибирский Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.	500	1000
309. Сосна корейская или маньчжурская кедровая сосна Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.	500	1500
310. Сосна крючковатая Pinus hamata D. Sosn.	75	100
311. Сосна крымская Pinus Pallasiana Lamb.	100	200
311а. Сосна Муррея Pinus Murrayana Balf	50	50
312. Сосна обыкновенная Pinus silvestris L.	50	50
313. Сосна пицундская Pinus pithyusa Stev.	200	300
314. Сосна погребальная Pinus funebris Kom.	75	75
315. Сосна приморская Pinus pinaster Sol.	200	300
316. Сосна румелийская Pinus peuce Gris.	200	300
317. Сосна смолистая Pinus resinosa Ait.	75	75
318. Сосна Станкевича Pinus Stankewiczi Fom.	200	300
319. Сосна Тунберга Pinus Thunbergii Parl.	100	100
320. Сосна черная австрийская Pinus nigra Arn.	100	150
321. Сосна эльдарская Pinus eldarica Medw.	100	400
322. Софора японская Sophora japonica L.	200	400
323. Страстоцвет голубой Passiflora coerulea L.	50	75
324. Стиракс обасска Styrax obassia Sieb. et Zucc.	400	1000
325. Сумах дубильный Rhus coriaria L.	75	75
326. Таволга дубровколистная Spiraea chamaedryfolia L.	30	25

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
326а. Таволга иволистная Spiraea salicifolia L.	30	15
326б. Таволга серая Spiraea cinerea Lbl.	30	15
327. Таволга японская Spiraea japonica L. f.	30	15
328. Терносливa Prunus insititia L.	500	2000
329. Тисс ягодный или европейский Taxus baccata L.	100	400
330. Тополь Populus L.	30	15
331. Трахикарпус Форчуна Trachycarpus Fortunei H. Wendl.	400	1000
332. Трескун амурский (сирень амурская) Ligustrina amurensis Rupr.	100	150
333. Туя западная Thuja occidentalis L.	30	25
334. Туя складчатая или гигантская Thuja plicata D. Don.	50	50
335. Фатсия японская Fatsia japonica (Thunb.) Desne. et Planch.	50	75
336. Фисташка настоящая Pistacia vera L.	500	2000
337. Фисташка туполистная или кевовое дерево Pistacia mutica Fisch. et Mey.	200	400
338. Хеномелес Маулея или низкая айва Chaenomeles Maulei (Mast.) C. K. Schneid.	100	200
339. Хеномелес японская или японская айва Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.	100	200
340. Хурма обыкновенная или хурма кавказская Diospyros lotus L.	300	500
341. Церцис европейский, Иудино дерево Cercis siliquastrum L.	100	200
342. Церцис канадский Cercis canadensis L.	100	200
343. Черемуха антипка, магалебка, кучина (вишня магалебская) Padus mahaleb (L.) Borkh.	200	400
344. Черемуха виргинская Padus virginiana (L. Mill.)	200	400
345. Черемуха Маака Padus Maackii (Rupr.) Kom.	100	150
346. Черемуха обыкновенная или кистевая Padus racemosa (Lam.) Gilib.	200	400
347. Черемуха пенсильванская Padus pensylvanica (L. f.) comb. nova	200	500

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
348. Черемуха поздняя Padus serotina (Ehrh.) Agardh.	200	500
349. Черешня, вишня птичья Cerasus avium (L.) Moench	400	500
350. Чингиль (чемыш) серебристый Halimodendron halodendron (Pall.) Voss	75	100
351. Чубушник венечный Philadelphus coronarius L.	30	25
352. Шелковица белая, тут, шовкун Morus alba L.	30	30
353. Шелковица черная Morus nigra L.	30	25
353а. Эвкалипт иволистый Eucalyptus salicifolia (Sol.) Cav.	15	25
353б. Эвкалипт пепельный Eucalyptus cinerea F. Muell.	30	25
354. Эвкоммия вязолистная Eucommia ulmoides Oliv.	200	400
355. Яблоня бурая или приречная Malus fusca (Raf.) C. K. Schneid.	50	30
356. Яблоня (культурные сорта)	100	200
357 Яблоня лесная, дикая Malus silvestris (L.) Mill.	100	150
358. Яблоня сливолистная или китайская, китайка Malus prunifolia (Willd). Borkh.	100	100
359. Яблоня Палласова или сибирская Malus Pallasiana Juz.	75	50
360. Яблоня ягодная Malus baccata (L.) Borkh.	75	50
361 Ясень белый Fraxinus ornus L.	200	300
362. Ясень ланцетный или ясень зеленый Fraxinus lanceolata Borkh.	200	300
363. Ясень маньчжурский Fraxinus mandschurica Rupr.	200	400
364. Ясень носолистный Fraxinus rhynchophylla Hance	200	300

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
365. Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L.	200	400
366. Ясень пенсильванский Fraxinus pennsylvanica March.	200	300
367. Ясень согдианский Fraxinus sogdiana Bge.	200	300

Примечания:

1. Партию семян, составляющую $^1/_{25}$ часть указанной в приложении 1 массы, считают малой.

2. От малой по массе партии семян отбирают образец, составляющий половину установленной массы для среднего образца.

3. Смешение нескольких малых по массе партий семян одного и того же вида и отбор от них одного среднего образца не допускается.

4. Несоблюдение установленной массы средних образцов допускается для семян, собранных с плюсовых деревьев и с отдельных деревьев особо ценных пород. Масса таких образцов семян должна быть не менее массы одной навески на чистоту.

5. Средний образец трескуна амурского, сирени обыкновенной в коробочках увеличивается в пять раз по сравнению с массой, установленной для чистых семян.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПАСПОРТ №_____

Составлен _____ 19____ г. на
(число, месяц)

партию семян _____
(полное русское и латинское видовое название породы)

массой _____ (_____) кг
(прописью) (цифрами)

1. Данная партия семян заготовлена _____
(название хозяйства, заготовившего

_____
данную партию, с указанием подчиненности)

2. Почтовый адрес хозяйства _____

3. Телеграфный адрес хозяйства _____

4. Время сбора семян, плодов, шишек _____ 19____ г.
(месяц, год)

5. Место сбора семян, плодов или шишек: _____
индекс

_____
лесосеменного района, подрайона, область, край, республика,

_____
лесхоз (ЛПХ, ЛКТ), лесничество

категория лесосеменного объекта _____
(ЛСП, ПЛСУ, ВЛСУ, лесосека и пр.)

для сортовых или улучшенных семян _____
номер плантации или участка,
квартал, выдел

6. Таксационная характеристика насаждения, плантации, участка:

состав _____, бонитет _____, тип леса _____,

группа возраста _____
(молодняки, средневозрастные,

_____
приспевающие, спелые)

Селекционная группа _____

Лесоводственная ценность семян _____
(нормальные, улучшенные, отборные)

Другие сведения _____

7. Для горных условий указать:

а) высоту над уровнем моря _____

б) склон (восточный, западный, северный, южный) _____

8. Кем и когда проводились предварительные обследования насаждений перед массовой заготовкой семян, плодов или шишек _____

9. Каким способом и когда извлекались семена из шишек, тип шишкосушилки, температура и т. д. _____

10. Каким способом и с применением каких механизмов обескрылены и очищены хвойные семена _____

11. Каким способом извлекались семена из сухих и сочных плодов _____

_____, каким способом очищались семена _____

12. Когда закончена очистка семян _____
(число, месяц, год)

13. Где хранятся семена _____

_____
(указать подробно: в специальном семенохранилище, приспособленном, в холодном или теплом помещении, в траншее, в погребе, под навесом и др.)

14. В какой таре хранятся семена _____
(бутыли, мешки, ящики и др.)

15. В счет плана какого года заготовлены семена _____

16. Для какой цели заготовлены семена _____
(для посева в своем хозяйстве,

_____
для снабжения других хозяйств, для опытных целей и т. д.)

М. П.

Должность и подпись лица, ответственного за составление паспорта —

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Замену этикеток на каждом месте хранения семян производят вслед за получением нового документа об их качестве

ЭТИКЕТКА

1. Видовое название породы _____

2. Лесоводственная ценность семян _____
(нормальные, улучшенные, отборные)

3. Название хозяйства (организации) _____

4 Год и месяц заготовки _____

5. Номер и дата паспорта _____

6. Первоначальная масса партии _____ кг

7. Число мест и вид тары _____

8. Порядковый номер тары _____

9. Масса семян в данной таре _____
(первоначальный и последующий, по мере

_____ кг
использования семян)

10. Номер удостоверения о кондиционности семян и дата его выдачи _____, класс качества семян _____ срок действия _____

Должность и подпись лица, ответственного за хранение семян

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

Все отобранные по настоящему акту образцы подлежат отправке на лесосеменную станцию не позднее двух суток со времени их отбора

АКТ № _____

отбора средних образцов для определения качества семян, принадлежащих

_____
(название хозяйства, организации)

_____
(район, область, республика)

19___ г. _____ мною, уполномоченным по отбору образцов
(месяц, число)

_____
(должность, хозяйство, организация)

_____
(фамилия, имя, отчество)

при участии _____
(фамилия, имя, отчество, должность каждого)

произведен осмотр семян и отбор средних образцов от следующих партий, хранящихся _____
(место хранения, хозяйство, организация)

Номера по порядку	Видовое название пород	Год урожая семян	В счет плана какого года заготовлены семена	Номер партии семян	Масса партии семян, кг	Вид тары и номера мест отдельно по каждой партии семян	Номер и дата копии паспорта	Откуда и когда получены семена	Масса среднего образца, г	Который раз семена подвергают анализу	Номер и дата последнего документа о качестве семян и клеймение лесосеменной станции, выдавший этот документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Образцы семян направлены на _____
(название лесосеменной станции)

Отбор образцов семян произведен по ГОСТ 13056.1—67

Подпись лица, уполномоченного по отбору образцов

Подписи членов комиссии:

Гарантия: Соблюдение правильных условий хранения партий семян сохранность партий семян от смешения, засорения _____

_____
(название хозяйства, организации)

гарантирует Подпись руководителя хозяйства (организации)_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подпись лица, ответственного за хранение семян _____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

АКТ ОБ ОЧИСТКЕ СЕМЯН

Настоящий акт составлен _____ дня . . месяца 19____ г.

_____

в _____
(наименование хозяйства, организации)

комиссией в составе _____
(фамилия, имя, отчество, должность каждого)

_____

в следующем:

в соответствии с заключением _____ лесосеменной станции по удостоверению о кондиционности семян или (ненужное зачеркнуть) результату анализа от _____ 19____ г. за № _____ в период с _____ по _____ 19____ г, произведена дополнительная очистка семян _____ партии № _____
(наименование породы)

собранной в _____ месяце 19 _____ г., в насаждениях _____ лесхоза _____ лесничества, согласно паспорту № _____ от _____ 19____ г.

Способ очистки _____
(дать краткое описание технических приемов

_____
очистки: обескрыливание, просеивание на ситах, отвеивание, водный способ и т. д.)

Результаты очистки:

1. Масса партии семян до очистки _____ кг

2. Масса партии семян после очистки _____ кг

3. Масса отхода _____ кг

Состав отхода _____
(перечислить)

Комиссия _____
(должность и фамилия каждого члена комиссии)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Изменение № 3 ГОСТ 13056.1—67 Семена деревьев и кустарников. Отбор образцов

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.07.90 № 2118

Дата введения 01.01.91

Приложение 1. Исключить видовые названия: 22, 38

Графа «Видовое название».

Пункт 9 после слова «Planch.» дополнить словом: «ex. Miq»

Пункт 55 после слова «кистистая» дополнить словом. «или»; исключить запятую и слова: «(бузина красная)».

Пункты 70, 72, 80, 276, 291, 307, 341, 349. Заключить в скобки слова: 70 — (берест или карагач); 72 — (туркестанский карагач); 80 — (грабинник); 276 — (береза лечебная); 291 — (терн); 307 — (пинния); 341 — (Иудино дерево); 349 — (вишня птичья).

Пункт 100 после слова «Mey.» дополнить словами: «ex Hohen.».

Пункт 101 после слова «Fisch.» дополнить словами: «ex Ledeb.».

Пункт 103 после слова «petraea» дополнить словом: «(Mattuschka)».

Пункт 114. Заменить слово: «Энгельмана» на «Энгельманна»; после слова «Engelmannii» дополнить словами: «Parry ex».

(Продолжение см. с. 346)

Пункт 118 после слова «Maximowiczii» дополнить словом: «Rupr».

Пункты 127, 167, 184, 223, 234, 244, 268, 282, 292. Наименование на русском языке изложить в новой редакции:

«127. Инжир (фиговое дерево);

167. Клен ложноплатановый (явор);

184. Крушина ломкая или ольховидная;

223. Миндаль низкий (степной или бобовник);

234. Ольха клейкая или черная;

244. Парротия персидская (железное дерево или боккаут);

268. Робиния лжеакация (белая акация);

282. Саксаул черный или солончаковый;

292. Слива растопыренная (алыча)».

Пункты 139, 208в, 271, 274, 281, 300, 309, 311, 343 изложить в новой редакции:

«139. Кария иллинойская (пекан)

Carya illinoensis (Wangh.) C. Koch.

208в. Лиственница камчатская (лиственница курильская)

Larix kamtschatica (Rupr.) Carr.

271. Роза коричная. Rosa cinnamomea L.

(Роза майская. Rosa majalis Herrm.)

Padus mahaleb (L.) Borckh.

274. Роза яблочная. Rosa pomifera Herrm.

(Продолжение см. с. 347)

(Роза мохнатая. Rosa vilosa L.)

281. Саксаул белый (песчаный).

Halixylon-persicum Bge. ex Boiss. et Buhse.

300. Солянка Рихтера

Salsola richteri (Moq.) Kar. ex Litv.

309. Сосна кедровая корейская.

Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.

311. Сосна Палласа (крымская)

Pinus pallasiana D. Don.»

343. Черемуха антипка (магалепка)

Пункты 5, 10, 13, 64, 87, 116, 140, 142, 147, 164, 169, 170, 171, 175, 200, 217, 233, 249, 263, 265, 284, 298, 299, 306, 308, 332, 334, 352, 357, 362. Исключить слова: «5 — айлант (китайский ясень); 10 — или шелковая акация; 13 — чертово дерево или шип-дерево; 64 — (вишня степная); 87 — или свидина; 116— (крушина слабительная); 140 — катальпа обыкновенная); 142 — запятую; 147 - (мыльное дерево); 164 — или приречный; 169 — или мелколистный; 170 — или трехлопастный; 171 — или платановидный; 175 — неклен; черноклен; 200— или венгерская; 217 — (Акация амурская); 233 — или белая; 249 — европейская или гребенчатая; 263 — (вязовик); 265 — (пузырник обыкновенный); 284— или дикий перец (элеутерокок); 298 — или кистевой; 299 — кара-черкез (черкез Палецкого); 306 — (сосна величественная); 308 — кедр сибирский; 332 — (сирень амурская); 334 — или гигантская; 352 — тут, шовкун; 357 — дикая; 362— или ясень зеленый».

Пункты 8, 61, 63, 67, 77, 78, 96, 105, 110, 112, 113а, 115, 117, 134, 144, 146, 159, 195а, 204, 208д, 210, 227, 236, 254, 262, 305, 308, 315, 320, 335, 339, 347, 351, 358, 359. Заменить слова:

8 — «Rupr» на «Maxim. et Rupr»;

61, 63, 67 — «comb. nova» на «Sok»;

77 — «двулопастый» на «двухлопастный»; «Z» на «L»,

78 — «обыкновенная» на «трехколючковая»; «Gleditschia» на «Gleditsia»;

96 — «Dipp.» на «C. Koch»;

105 — «jezoensis» на «ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex)»;

110 — «omorica Purk» на «omorika (Pančič) Purk»;

112 — «excelsa Link» на «abies (L.) Karst»,

113а — «F. et. M.» на «Fisch. et Mey»;

115 — «Wimm» на «Koch»;

117 — «Maxim» на «Rupr»;

134 — «семилопастный, диморфант или белый орех» на «семилопастный (диморфант)»;

144 — «Loud» на (D. Don) G. Don fil»;

146 — «Rgl» на «Regel»;

159 — «Sieb. et Zucc.» на «(Sieb et Zucc.) Endl»;

195а — «glauca Mayr» на «menziesii var. glauca Schneid»;

204 — «mandshurica» на «mandshurica»;

208 д — «A. Henzy» на «A. Henry»,

210 — «Djil. spec. nov.» на «Dyl.»

227 — «M. B.» на «Bieb»:

236 — «Зимбольда» на «Зибольда»;

254 — «Mast» на «Er. Schmidt.»;

262 — «(Oliv.) Kom.» на «Bean»;

305 — «montana Mill» на «mugo Turra»;

308 — «(Rupr.) Mayr» на «Du Tour»,

315 — «Sol» на «Aiton»,

320 — «Arn» на «Arnold»;

335 — «Desne» на «Decne»;

339 — «Хеномелес японская» на «Хеномелес японский»;

347 — «comb nova» на «Sok»;

351 — «Чушубник» на «Чубушник»;

(Продолжение см. с. 348)

358 — «китайская, китайка» на «китайская (китайка)», «Borkh» на «Borckh»;

359 — «Палласова» на «Палласа»;

Пункт 187 после слова «officinalis» дополнить буквой: М.

Пункт 190 после слова «Kunth.» дополнить словами: «ex I. Iljinsk.».

Пункт 193 после слова «Maxim» дополнить словами: «et Rupr.».

Пункт 195 после слова «Fisch.» дополнить словами: «ex Trautv.».

Пункт 219 после слова «aquifolium» дополнить словом: «(Pursh)»

Пункт 232. Латинское наименование изложить в новой редакции: «Alnus hirsuta (Spach) Turcz ex Rupr.».

Пункт 285 после слова «sempervirens» дополнить словами. «(Lamb. ex D. Don)»

Пункт 286 дополнить словами: «(Секвойядендрон гигантский Sequoiadendron giganteum Lindl.)».

Пункт 326 после слова «дубровколистная» дополнить словами: «(спирея дубровколистная)».

Пункт 326а после слова «иволистная» дополнить словами: «(спирея иволистная)».

Пункт 326б после слова «серая» дополнить словами: «(спирея серая)».

Пункт 327 после слова «японская» дополнить словами. «(спирея японская)».

Приложение дополнить видовыми названиями:

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
18а. Барбарис Тунберга Berberis thunbergii D. S.	100	50
25а. Береза повислая Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh).	75	25
50а. Боярышник крупноколючковый Crataegus mactacantha Lodd.	100	200
506. Боярышник крупносемянный Crataegus macrosperma Ashe	100	100
50в. Боярышник Максимовича Crataegus maximowiczii Schneid.	100	100
50г. Боярышник мягковатый Crataegus submollis Sarg.	100	200
53а. Боярышник пятипестичный Crataegus pentagyna Waldst. et Kit.	100	100
59а. Вейгела цветущая Weigela florida (Bge) A.DC.	30	5
68а. Володушка кустарниковая Bupleurum fruticosum L.	50	20
84а. Девичий виноград пятилисточковый Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch	100	100
88а. Дерен отпрысковый Cornus stolonifera Michx.	200	100
98а. Дуб грузинский Quercus iberica Stev.	5000	5000

(Продолжение см. с. 349)

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
98б. Дуб каштанолистный Quercus castaneifolia C. A. Mey.	5000	7000
128а. Ирга колосистая Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch	75	15
176а. Клен Шведлера Acer platanoides (schwedleri)	300	300
221а. Мелия ацедарах Melia azedarach L.	500	1000
227а. Можжевельник зеравшанский Juniperus seravschanica Kom	100	200
229а. Можжевельник полушаровидный Juniperus semiglobosa Rgl	100	100
238а. Орех сердцевидный Juglans cordiformis Maxim	1000	5000
245а. Пираканта городчатая Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.	50	20
245б. Пираканта ярко-красная Pyracantha coccinea (L.) M. Roem.	50	20
260а. Платикладус восточный, плосковеточник (биота восточная) Platycladus orientalis (L.) Franco	100	150

(Продолжение см. с. 350)

Продолжение

Видовое название	Максимальная масса партии, кг, от которой отбирается один образец	Масса среднего образца, г
262а. Прутняк обыкновенный Vitex agnus-castus L.	50	50
266б. Ранетка пурпурная Malus robusta (Carr.) Rehd	100	50
272а. Роза сизая Rosa glauca Pourret	75	50
287а. Сирень венгерская Syringa josikaea Jacq. f.	75	20
293а. Слива черная Prunus nigra Ait	500	1000
294а. Смородина альпийская Ribes alpinum L.	50	15
307а. Сосна кедровая европейская Pinus cembra L.	500	500
327а. Терескен серый Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.	50	10
349а. Черешня (культурные сорта)	400	500

Примечание 5 после слов «сирени обыкновенной» дополнить словами: «и венгерской».

(ИУС № 10 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru