ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРЕМИКСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26573.0–85

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством заготовок СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Чемодуров, Н. В. Лисицына, С. Н. Шкатова, В. М. Шевандина, Р. В. Катруш, З. И. Сенина, Р. А. Акимова, М. Г. Багишвили

ВНЕСЕН Министерством заготовок СССР

Зам. министра **М. Л. Тимошишин**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июня 1985 г. № 1983

УДК 636.087:006.354 Группа С14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРЕМИКСЫ

Технические условия

Premixes. Specifications

ГОСТ 26573.0—85

ОКП 92 9140

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июня 1985 г. № 1983 срок действия установлен

с 01.07.86
до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на премиксы — однородные смеси измельченных биологически активных веществ, аминокислот, лечебных и других препаратов и наполнителя, предназначенные для обогащения комбикормов, белково-витаминных добавок (БВД) и кормовых смесей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Премиксы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту и рецептуре, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Для производства премиксов применяют следующие наполнители:

отруби пшеничные по ГОСТ 7169—66;

пшеницу;

ячмень кормовой по ГОСТ 25344—82;

кормовой концентрат лизина (кормолизин);

дрожжи кормовые по ГОСТ 20083—74 — применяют до 1 января 1988 г;

БВК (паприн) — допускается применять при производстве премиксов для межхозяйственных комбикормовых предприятий Министерства сельского хозяйства СССР. Премиксы с БВК (паприном) используют в комбикормах для птицы, кроме молодняка

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

и бройлеров первых возрастов, для свиней, а также телят в возрасте от 1 до 6 мес.

1.3. Для производства премиксов применяют препараты, разрешенные к вводу в корма Министерством сельского хозяйства СССР.

1.4. Допускается при производстве премиксов для межхозяйственных комбикормовых предприятий применять концентраты премиксов, изготовленные по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.5. Качество премиксов должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и нормы			
	премиксов, вырабатываемых для государственных комбикормовых предприятий на основе:		премиксов, вырабатываемых для межхозяйственных комбикормовых предприятий на основе:	
	отрубей, кормового концентрата лизина, кормовых дрожжей	измельченного зерна	отрубей	БВК (паприн)
Внешний вид, цвет, запах	Однородная смесь, соответствующая характеру наполнителя и набору биологически активных компонентов без признаков плесени			
Влажность, %, не более	10,0	13,0	13,0	10,0
Крупность: остаток на сите с сеткой № 1, 2, %, не более	5,0	5,0	—	—
Содержание витамина А, млн. международных единиц в 1 т премикса	В соответствии с рецептами, утвержденными в установленном порядке			
Содержание марганца, килограммов в 1 т премикса	В соответствии с рецептами, утвержденными в установленном порядке		—	—
Наличие металломагнитных примесей на 1 кг премикса, мг, не более:				
частиц до 2 мм включительно	30	30	40	40
частиц размером свыше 2 мм	Не допускается		Не допускается	

Примечание. Допускаемые отклонения содержания марганца от предусмотренного по рецепту не должны превышать 10 %, витамина А — 15 %.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Премиксы не токсичны, в воздушной среде в присутствии других веществ не образуют токсичных соединений. При попадании в организм не аккумулируются. Пыль премикса может вызвать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и органов пищеварения, а также кожных покровов.

2.2. При работе с премиксом (отборе проб, проведении испытаний и других операциях) следует применять индивидуальные средства защиты: спецодежду, спецобувь, респираторы, резиновые перчатки.

2.3. Помещения, в которых проводятся работы с премиксами, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией. Испытания по определению качества премикса проводят в вытяжном шкафу в лаборатории.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 23462—79.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб — по ГОСТ 13496.0—80.

4.2. Определение внешнего вида и цвета проводят органолептически: 100 г испытуемого премикса помещают на лист бумаги и, перемешивая, рассматривают при естественном свете.

4.3. Определение запаха — по ГОСТ 13496.13—75.

4.4. Определение влажности — по ГОСТ 13496.3—80.

4.5. Определение крупности — по ГОСТ 26573.3—85.

4.6. Определение витамина А — по ГОСТ 26573.1—85.

4.7. Определение марганца — по ГОСТ 26573.2—85.

4.8. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 13496.9—73.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 23462—79.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие премиксов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения премиксов с влажностью не более 10 % — 5 месяцев, с влажностью 13 % — 4 месяца с момента изготовления.

Изменение № 1 ГОСТ 26573.0—85 Премиксы. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.88 № 4434

Дата введения 01.07.89

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «известняковая мука по ГОСТ 26826—86».

Пункт 1.5. Таблицу дополнить графой:

Наименование показателя	Характеристика и нормы
	премиксов для крупного рогатого скота, вырабатываемых для государственных комбикормовых предприятий на основе известняковой муки
Внешний вид, цвет, запах	Однородная смесь, соответствующая характеру наполнителя и набору биологически активных компонентов, без признаков плесени
Влажность, %, не более	9,0

(Продолжение см. с. 300)

Продолжение

Наименование показателя	Характеристика и нормы
	премиксов для крупного рогатого скота, вырабатываемых для государственных комбикормовых предприятий на основе известняковой муки
Крупность:	
остаток на сите с сеткой № 1, 2, %, не более	5,0
Содержание витамина А, млн. международных единиц в 1 т премикса	В соответствии с рецептами, утвержденными в установленном порядке
Содержание марганца, килограммов в 1 т премикса	В соответствии с рецептом, утвержденным в установленном порядке
Наличие металломагнитных примесей на 1 кг, премикса, мг, не более	
частиц до 2 мм включительно	100
частиц размером свыше 2 мм	Не допускается

Пункт 6.1 дополнить абзацем: «Гарантийный срок хранения премиксов для крупного рогатого скота на основе известняковой муки — 4 мес с момента изготовления».

(ИУС № 4 1989 г.)

Редактор *Н. В. Бобкова*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 15.07.85 Подп. к печ. 13.09.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,24 уч.-изд. л.
Тир. 30000 экз. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2044

Цена 3 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$с^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м \cdot кг \cdot с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с \cdot А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	$кд \cdot ср$
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$

gost.e-ecolog.ru