ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 72130— 2025

ЗВЕРОВОДСТВО

Термины и определения

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева» (ФГБНУ НИИПЗК) и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 475 «Пушное звероводство и кролиководство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2025 г. № 575-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Руководитель разработки настоящего стандарта д. б. н., чл.-корр. РАН Г.Ю. Косовский.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области звероводства.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Не рекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Термины-синонимы без пометы «Нрк» приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Дополнения и изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, синонимы — курсивом.

В настоящем стандарте часть терминов приведена с обратным порядком слов в соответствии с утвержденными (официальными) названиями пород и типов животных.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗВЕРОВОДСТВО

Термины и определения

Furfarming. Terms and definitions

Дата введения — 2026—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области звероводства.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по звероводству, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения

Виды, породы и типы пушных зверей, разводимых в хозяйствах

1 **норка:** Хищный пушной зверь семейства куньих *(Mustelidae)*, живой массой 1,2—4,2 кг, имеющий гибкое, вытянутое тело среднего размера, хвост несколько короче половины длины тела, узкую морду с маленькими ушами, короткий, густой, плотный мех с очень густой подпушью, пальцы лап которого соединены ярко выраженными перепонками, самцы крупнее самок, в помете обычно пять — восемь щенков.

Примечания

1 На звероводческих фермах разводят норок, принадлежащих к виду норка американская (*Neogale vison*).

2 У норки известно большое количество мутаций окраски волосяного покрова. Полностью генотип окраски дикой норки может быть обозначен формулой *AABBCCddeeffGGHHIIJJKKMMnnOOPPRRQQssTTwwzz*.

2 **норка стандартная:** Порода норок коричневой окраски, которая варьируется от коричневой до почти черной, кроющие волосы темнее пуховых и более равномерно окрашены по длине, окраска подпуши имеет большую изменчивость по цвету, интенсивности и однородности окраски по длине волоса.

Примечания

1 Норки стандартные получены скрещиванием нескольких подвидов диких американских норок и последующей селекцией помесей.

2 Торговое название шкурок — «темно-коричневые».

3 **цветные норки:** Норки разной окраски мутантного происхождения или полученные в результате комбинативной изменчивости, отличающиеся по фенотипу от стандартных.

4 **норка темно-коричневая:** Тип породы норок стандартных, у которых общая окраска варьируется от темно-коричневой до почти черной, окраска остевых волос темно-коричневая, пуховых — темно-коричневая или темно-серая, глаза темно-коричневые, носовое зеркало пигментировано.

Примечания

1 У норок темно-коричневого типа наблюдается большая изменчивость в длине остевых волос различных категорий. Воспроизводительная способность норок темно-коричневого типа высокая. Размер тела крупный, телосложение крепкое.

2 Торговое название шкурок — «темно-коричневые».

Издание официальное

5 **норка коричневая:** Тип породы норок стандартных, общая окраска которых варьируется от светло- до темно-коричневой, подпушь светло-коричневая, что создает контраст с окраской ости, глаза темно-коричневые, носовое зеркало пигментировано.

Примечания

1 При создании типа была сохранена окраска, характерная для диких норок, поэтому они отличаются от других типов норок стандартных более светлой окраской волосяного покрова. Норки коричневые в среднем крупнее норок других типов норок стандартных.

2 Торговое название шкурок — «коричневые».

6 **норка черная:** Тип породы норок стандартных с почти черной окраской волосяного покрова, кроющие волосы черные или почти черные, однородно окрашенные по длине, окраска пуховых волос темно-коричневая, окраска волосяного покрова на спине и брюшке однородная, волосяной покров хорошо уравнен, цвет глаз черный.

Примечания

1 Норки данного типа по сравнению с другими типами норок несколько мельче по размеру тела и имеют более низкую воспроизводительную способность.

2 Торговое название шкурок — «черные».

7 **норка джет черная:** Тип породы норок стандартных, имеющих черную блестящую равномерную по всему туловищу окраску волосяного покрова, подпушь темно-серая или темно-коричневая, однородно окрашенная по всей длине, носовое зеркало, а иногда и небо черные.

Примечания

1 Норки отличаются ярко выраженным блеском окраски и менее коротким и уравненным волосяным покровом.

2 Торговое название шкурок — «черные».

8 **норка крестовка:** Тип породы норок стандартных разной окраски, несущих ген, который обуславливает образование на хребте крестообразного рисунка из пигментированных волос, глаза черные, носовое зеркало розовое.

Примечания

1 Выраженность рисунка (креста) и интенсивность пигментированных остевых кончиков зависят от рецессивных генов окраски (*bb, pp* и т. д.). Желательный тип крестовок — чистая окраска пигментированных волос, равномерно расположенных на спине и боках, четкий, ровный рисунок, отсутствие желтоватого оттенка у белых волос. Животные крупные, крепкие, дают хорошее потомство.

2 Торговое название шкурок — «крестовки».

9 **норка черный хрусталь:** Тип породы норок стандартных, которые имеют черную окраску с белой вуалью различной интенсивности, подпушь графитового цвета, плотность белой вуали наиболее сильно выражена на спине и постепенно уменьшается по направлению к чреву, волосяной покров средней высоты.

Примечание — Торговое название шкурок — «седые».

10 **норка соболиная темно-коричневая:** Тип породы норок стандартных, созданный на основе мутации длины волос, от обычных норок данного типа отличающийся значительно большей длиной остевых и пуховых волос.

Примечания

1 Средняя длина остевых волос составляет 3,2—3,4 см, пуховых — 2,1—2,4 см. Длина волос обусловлена рецессивными генами *ll*, но контролируется также и полигенами, в связи с чем для них характерна значительная изменчивость по этому признаку. Окраска этих норок темно-коричневая.

2 Торговое название шкурок — «темно-коричневые».

11 **норка пастель:** Порода норок, окраска которых варьируется от светло- до темно-коричневой, пух серый, с легким коричневым оттенком, цвет глаз темно-коричневый, почти черный, носовое зеркало депигментировано.

Примечания

1 Наиболее темные особи близки по окраске к норкам коричневым, но отличаются от них хорошо выраженным голубовато-серым оттенком. Норки пастель отличаются крупным размером и хорошей воспроизводительной способностью.

2 Торговое название шкурок — «пастель».

12 **норка пятнистая куйтежская:** Тип породы норок пастель, которые имеют белую окраску на брюшке, спина и лоб пигментированы, но имеют белые пятна и отдельные седые волосы, на боках пигментированная окраска постепенно переходит в белую, а соотношение пигментированных и белых участков сильно варьируется.

Примечания

1 Норка пятнистая куйтежская создана на основе доминантно-рецессивной комбинации генов окраски карельская пятнистая и пастель.

2 Торговое название шкурок — «пестрые».

13 **норка паломино американское:** Порода норок, окраска которых варьируется от светло-бежевой до темно-бежевой, пух светло-бежевый, глаза розовые с зеленовато-желтым отблеском, носовое зеркало депигментировано.

Примечания

1 Норки крупные и плодовитые.

2 Торговое название шкурок — «паломино».

14 **норка серебристо-голубая:** Порода норок, окраска которых варьируется от светло-серой до темно-серой, подпушь серая по всей длине, глаза черные, носовое зеркало депигментировано.

Примечания

1 Желательный тип окраски пепельно-серый с выраженным голубым оттенком. Норки данной породы отличаются крупным размером и хорошей воспроизводительной способностью.

2 Торговое название шкурок — «серебристо-голубые».

15 **норка алеутская:** Порода норок, окраска которых почти черная с голубым оттенком, с почти черной остью и темно-голубым пухом, глаза черные, носовое зеркало депигментировано.

Примечания

1 Норки алеутские меньше норок стандартных и имеют более низкую воспроизводительную способность.

2 Торговое название шкурок — «алеутские».

16 **норка белая хедлунд:** Порода норок чисто-белой окраски, глаза черные, носовое зеркало депигментировано.

Примечания

1 По продуктивности данные норки не уступают норкам стандартным.

2 Торговое название шкурок — «белые».

17 **норка рощинская пестрая:** Тип породы норок белая хедлунд, которые сходны с норками стандартной окраски, но имеют большую белую пятнистость на брюшке и иногда на голове и лапах.

Примечания

1 У норок рощинских пестрых окраска пигментированных участков тела зависит от генотипа их основной окраски, пятна могут быть различного размера и конфигурации. Норки данного типа отличаются высокими продуктивными качествами, однако по степени проявления пестрой окраски наблюдается значительная изменчивость.

2 Торговое название шкурок — «пестрые».

18 **норка соклотпастель:** Порода норок светло-коричневой окраски с выраженным дымчато-голубым оттенком, подпушь бежевая с голубым оттенком, глаза красные.

Примечания

1 Окраска более светлая, чем у норок пастель. Норки соклотпастель отличаются крупным размером и хорошей воспроизводительной способностью.

2 Торговое название шкурок — «топаз».

19 **норка снежный топаз:** Тип породы норок соклотпастель, окраска которых представляет собой белую вуаль из остевого волоса поверх дымчато-коричневой подпуши, плотность белой вуали наиболее сильно выражена на спине и постепенно уменьшается по направлению к чреву, белая пятнистость по чреву отсутствует, глаза коричневые, пигментация на носовом зеркале и ротовой полости отсутствует.

Примечания

1 Волосяной покров большой густоты и средней высоты. Самцы и самки имеют хорошие воспроизводительные способности.

2 Торговое название шкурок — «седые».

20 **норка орхидпастель:** Порода норок светло-коричневой окраски с голубым пухом, глаза темно-коричневые, иногда с красноватым оттенком.

Примечания

1 По размеру и воспроизводительным способностям не уступают норкам пастель.

2 Торговое название шкурок — «пастель».

21 **норка ампалосеребристая:** Порода норок серо-бежевой окраски, пух светло-голубой, глаза коричнево-желтые, крупные.

Примечание — Торговое название шкурок — «жемчужные».

22 **норка мойлалеутская:** Порода норок светло-коричневой окраски с бледно-лиловым оттенком, пух серый с голубыми вершинами, глаза ярко-розовые.

Примечание — Торговое название шкурок — «лавандовые».

23 **норка алеутская стальная:** Порода норок почти черной окраски с голубым оттенком.

Примечания

1 Норки алеутские стальные близки по окраске к норкам алеутским, но несколько светлее их, у них более выражена разница в окраске ости и пуха. Воспроизводительная способность норок алеутских стальных выше алеутских.

2 Торговое название шкурок — «голубой ирис».

24 **норка сапфир:** Порода норок голубой окраски, которая варьируется от светлых до темных тонов, пух голубой, глаза темно-карие, носовое зеркало депигментировано.

Примечание — Торговое название шкурок — «сапфир».

25 **норка мойлсапфир:** Порода норок, окраска которых варьируется от очень светло-голубой до светло-голубой.

Примечание — Торговое название шкурок — «виолет».

26 **норка ампалосапфир:** Порода норок светло-серо-бежевой окраски, носовое зеркало и ротовая полость у них депигментированы.

Примечания

1 Норки отличаются крупным размером, высокими воспроизводительными способностями.

2 Торговое название шкурок — «жемчужные».

27 **норка мойлпастельсеребристая:** Порода норок светло-серой окраски с голубовато-бежевым оттенком, пух голубой, тон окраски от светлого до темно-голубого с четко выраженным сиреневым оттенком на спине, глаза темно-красные.

Примечание — Торговое название шкурок — «хоуп».

28 **норка соклотпастельсеребристая:** Порода норок светло-серой окраски с голубовато-бежевым оттенком, пух голубой, глаза темно-красные.

Примечания

1 Норки данной породы отличаются достаточно высокими продуктивными качествами.

2 Торговое название шкурок — «платинотопаз».

29 **норка альбинопастель:** Порода норок, основная окраска которых белая, без желтоватого оттенка, носовое зеркало и ротовая полость депигментированы, цвет глаз розовый.

Примечания

1 Норки отличаются уравненным густым волосяным покровом, крупным размером, высокими воспроизводительными способностями (размножаются лучше, чем норки хедлунд).

2 Торговое название шкурок — «белая регаль».

30 **лисица:** Хищный пушной зверь семейства псовых *(Canidae)*, живой массой 5—10 кг, средних размеров, самцы крупнее самок, голова с вытянутой мордой, уши заостренные, волосяной покров высокий, довольно густой и мягкий, в помете обычно рождается четыре-пять слепых щенков.

Примечания

1 В клеточном разведении используют обыкновенную лисицу (*Vulpes vulpes),* в процессе клеточного разведения появился целый ряд лисиц, полученных в результате рецессивных и доминантных мутаций окраски.

2 Генотип дикой красной лисицы обозначен формулой: *AABBCCEEGGPPSSRRww.*

31 **лисица серебристо-черная:** Порода лисиц, окраска которых варьируется от почти черной до светло-серебристой, кончик хвоста белый (тип); остевые волосы могут быть черными, белыми, серебристыми или платиновыми; белая пятнистость на груди, брюхе и лапах может варьироваться в широких пределах.

Примечание — Лисицы серебристо-черные получены в результате мутации окраски дикой канадской лисицы. Отличаются крупным размером, густым и пышным волосяным покровом с 90 — 100 %-ной серебристостью, высокой воспроизводительной способностью.

32 **пушкинский тип лисиц:** Тип породы лисиц серебристо-черных с густым пышным волосяным покровом средней длины (длина остевых волос 71—75 мм), в опушении которых имеются как серебристые, так и платиновые волосы, примерно в равном соотношении, вуаль хорошо развита, чистого тона, подпушь серо-голубая.

33 **лисица платиновая:** Тип породы лисиц серебристо-черных с платиновым волосом, белыми пятнами на голове, шее, брюхе и конечностях, образующими характерный рисунок, и окраской, определяемой генотипом, глаза коричневые или голубые.

34 **савватьевский тип лисиц:** Тип породы лисиц серебристо-черных, характеризуемый крупным размером, уравненным, густым длинным волосяным покровом, общая окраска серебристо-черная, кончики кроющих волос иссиня-черные блестящие, остевые волосы платиновые, светлая зона чисто белого цвета — 12—17 мм, окраска пуха от серой до темно-серой с голубым оттенком, хорошо развитая вуаль прикрывает серебро.

35 **лисица снежная:** Тип породы лисиц серебристо-черных, окраска белая, иногда с легким кремовым оттенком, уши, пятна на лапах, морде и спине черные, пятна на спине образуют ремень, подпушь белая, на месте черных пятен — темно-серая, глаза темно-коричневые.

36 **лисица арктический мрамор:** Тип породы лисиц серебристо-черных, основная окраска которых белая, есть черные волосы, они расположены на лбу, вокруг глаз, на ушах, лопатках, спине и у основания хвоста, развитие черного пигмента сильно варьируется.

37 **бирюлинский тип лисиц:** Тип породы лисиц серебристо-черных, отличающийся от других типов серебристо-черной породы наиболее коротким и уравненным волосяным покровом (длина остевых волос 61—65 мм).

Примечание — Структура опушения лисиц данного типа близка к структуре опушения диких лисиц, серебристость у них обусловлена в основном наличием серебристых волос. Волосяной покров густой и упругий. Количество платиновых волос с белым основанием и пигментированным кончиком незначительно (15 %—25 %) или они отсутствуют. Ширина серебристого кольца в основном 10—12 мм, вуаль хорошо развита, чистого тона, подпушь серая. Тон окраски средний.

38 **лисица красная рощинская:** Тип породы лисиц серебристо-черных, отличающийся красной окраской волосяного покрова, небольшая серебристость допускается на огузке, грудь и брюшко белые, подпушь темно-серая с красными вершинами.

Примечание — Тип создан на основе скрещивания диких красных европейских лисиц с лисицей серебристо-черной.

39 **лисица огневка вятская:** Тип породы лисиц серебристо-черных, имеющих яркую темно-красную окраску волосяного покрова, без серебристости, незначительная серебристость, приближающаяся к тону основной, допускается в небольшом количестве лишь на огузке.

Примечание — Тип создан на основе дикой красной камчатской лисицы при скрещивании с лисицей серебристо-черной. Воспроизводительная способность несколько ниже, чем у лисиц серебристо-черных.

40 **лисица жемчужная:** Порода лисиц, окраска которых чистого пепельно-серого цвета, пух светло-серый с голубоватым оттенком, интенсивность «серебра» большая, светлая зона чисто-белого цвета с выраженным блеском, глаза коричневые, носовое зеркало черное.

41 **лисица бургундская:** Порода лисиц, общая окраска которых коричневая, с хорошо выраженным красноватым оттенком и серебристостью, серебристость обусловлена наличием преимущественно

платиновых волос и варьируется в широких пределах, пух светло-коричневый, кончик хвоста белый, глаза светло-коричневые или желтые.

42 **лисица коликотт:** Порода лисиц, окраска которых варьируется от бежевой до коричневой среднего тона, в среднем она светлее, чем у бургундской лисицы, пух бежевый, глаза голубые.

Примечание — Большинство лисиц светлого тона имеют нежелательный желтоватый оттенок, серебристость 90 %—100 %, но у светлых особей выражена слабо.

43 **песец:** Хищный пушной зверь семейства псовых (*Canidae*), род песцов (*Alopex lagopus*), средних размеров, живая масса составляет 8—12 кг, тело удлиненное, хвост составляет примерно половину длины тела, голова вытянутая, уши широко расставленные, длинные, но слабо выступающие из зимнего меха, вершины ушей закругленные, самцы крупнее самок, плодовитость в среднем 11—12 щенков.

Примечание — В звероводческих хозяйствах разводят голубых песцов. Окраска волосяного покрова голубых песцов варьируется в широких пределах: от бежевой до коричневой и от светло-серой до почти черной. Окраска подпуши варьируется от белой до темно-серой. Генотип дикой голубой формы песца можно обозначить следующей формулой: *CCDDEEFFGGIIsstt*.

44 **песец серебристый:** Порода песцов серой окраски различной интенсивности, окраска подпуши которых варьируется от светло- до темно-серой и равномерно окрашена по всей длине, кроющие волосы платиновые или сплошь пигментированные, белая зона кроющих волос на фоне темной подпуши создает впечатление серебристости, глаза темно-карие, носовое зеркало пигментировано.

45 **песец кольский:** Тип породы песцов серебристых, характеризующийся средним размером тела, темной, почти черной, окраской волосяного покрова, сходной с окраской лисицы серебристо-черной, интенсивность платиновых волос большая, подпушь темно-серая.

46 **песец вуалевый:** Порода песцов, окраска которых существенно отличается от серебристых за счет более светлой окраски подпуши, пигментированные кончики платиновых волос на фоне белых вершин пуховых волос образуют вуаль, глаза песцов темно-карие, носовое зеркало пигментировано.

Примечание — Подпушь у песцов вуалевых зонально окрашена и имеет серое различной интенсивности основание и белые вершины. Кроющие волосы преимущественно платиновые. Выраженность вуали, а также цвет пигментированных кончиков кроющих волос и их длина отличаются большой изменчивостью.

47 **песец родниковский тень:** Тип породы песцов вуалевых, окраска чисто-белая с легкой вуалью графитного цвета, равномерно расположенной по площади спины, глаза темно-коричневые или голубые, носовое зеркало депигментировано.

Примечание — Песцы данного типа отличаются крупным размером тела, густым, шелковистым, хорошо уравненным волосяным покровом с длиной остевых волос не более 50 мм.

48 **песец пушкинский:** Тип породы песцов вуалевых с окраской среднего тона, вуаль хорошо выражена, крупного размера, отличаются густым, хорошо уравненным волосяным покровом (длина волос 55—60 мм).

49 **собака енотовидная:** Хищный пушной зверь семейства псовых *(Canidae*), единственный представитель рода (*Nyctereutes procyonoides*), средних размеров, живой массой 8—10 кг, тело сравнительно слабо вытянуто, голова небольшая с короткой и острой мордочкой и короткими ушами, слабо выдающимися из волосяного покрова, по бокам морды волосы более длинные, образуют «баки», хвост короткий и пушистый, плодовитость в среднем шесть — восемь щенков.

Примечание — Окраска у собак енотовидных серовато-коричневая различной интенсивности. Окраска подпуши варьируется от светло-желтой до темно-коричневой. Кроющие волосы зонально окрашены — основание и кончик темные, средняя зона светлая. Окраска светлой зоны варьируется от светло-желтой, почти белой, до ярко-желтой. Окраска лап темная. Мордочка светлее туловища, но вокруг глаз окраска темная, почти черная. Волосяной покров очень густой, длинный, достаточно грубый, неуравненный.

50 **одомашненная форма енотовидной собаки,** *стандартная енотовидная собака*: Порода собак енотовидных золотистой окраски, окраска вершин пуховых волос и осветленной зоны кроющих волос оранжевая, пигментированные кончики кроющих волос темные, почти черные, образующие хорошо выраженную вуаль, волосяной покров густой, хорошо уравненный, длина кроющих волос 80—85 мм.

Примечания

1 При бонитировке выделяют два типа собак енотовидных: золотистый (общая окраска волосяного покрова оранжево-коричневая; осветленная зона остевых и вершины пуховых волос оранжевые, кончики остевых волос

черные, вуаль хорошо выражена на спине и боках) и серебристый (общая окраска волосяного покрова серебристо-коричневая; осветленная зона остевых волос белая, вершины пуховых волос светло-желтые или светло-коричневые, кончики остевых волос черные, вуаль хорошо выражена на спине и боках).

2 Известная мутация, обуславливающая белую окраску волосяного покрова.

51 **соболь:** Хищный пушной зверь семейства куньих (*Mustelidae*), род соболей (*Martes zibellina*), животное средних размеров, живая масса которых составляет 0,9—1,8 кг, туловище вытянутое, конечности короткие, пальцеходящие, лапы широкие, мех густой, мягкий, шелковистый, пушистый хвост приблизительно равен трети длины тела, морда довольно узкая, глаза черные и выпуклые, довольно большие уши, окраска от светлой палево-желтой до почти черной, самцы крупнее самок, в помете бывает 1—12 щенков, в среднем три детеныша.

52 **соболь черный:** Порода соболей темной, почти черной, окраски волосяного покрова, окрас равномерный, горловое пятно небольшое или отсутствует, подпушь темно-серая, с голубым оттенком, превосходит диких по размеру и качеству опушения.

53 **соболь пушкинский янтарный:** Тип породы соболей черных, окраска волосяного покрова которых песочного цвета, без горлового пятна, седые волосы отсутствуют, окраска мордочки несколько светлее или в тон окраски туловища, глаза и носовое зеркало коричневые.

54 **соболь салтыковский 1:** Порода соболей с густым, шелковистым волосяным покровом темно-коричневой окраски, цвет ости темно-коричневый или коричневый, пух серо-голубой, равномерно окрашенный по всей длине, окраска мордочки и ушей несколько светлее окраски туловища, глаза коричневые, носовое зеркало имеет черную пигментацию.

Примечание — Тело длинное, крупнее, чем у соболей черных. Самки имеют высокую воспроизводительную способность.

55 **соболь салтыковский серебристый:** Порода соболей с основной окраской волосяного покрова темно-коричневого цвета чистого тона, в котором депигментированные (седые) остевые волосы составляют примерно 30 %, коричневые и депигментированные остевые волосы равномерно распределены по всей поверхности тела, пуховый волос серо-голубой, глаза коричневые, носовое зеркало имеет коричневую пигментацию.

56 **хорек:** Пушной зверь семейства куньих *(Mustelidae)*, рода хорьки *(Mustela putorius)*, средних размеров, живая масса которого составляет 1,1—3,3 кг, телосложение легкое, туловище тонкое, удлиненное, конечности короткие, на пушистый хвост приходится примерно половина длины тела, голова небольшая, узкая, уши широкие, округлые, цвет подпуши варьируется от светло-желтого до оранжевого и от кремового до бежево-серого, окраска кроющих волос темно-коричневая или черная, самцы крупнее самок, плодовитость от 7 до 11 щенков.

Примечание — В звероводческих хозяйствах разводят хорьков, полученных в результате скрещивания дикого черного хорька и одомашненного фуро. Окраска хорьков фуро белая, с желтоватым оттенком, глаза красные.

57 **хорек тверской:** Порода хорьков светло-бежевой окраски, с черными пигментированными вершинами остевых волос, кремовым, до почти белого, окрасом пуха, окраска мордочки животного светло-кремовая, почти белая, с выраженным рисунком в виде маски, глаза черные, носовое зеркало частично или полностью депигментировано.

58 **хорек тверской пастелевый:** Порода хорьков, у которых волосяной покров светло-бежевый, длинный, густой у самцов, у самок — средней густоты, остевой волос коричневый, уравненный по длине, пуховый волос имеет кремовую окраску вершин, голова имеет слабо выраженный рисунок «маска» на морде, глаза черные, носовое зеркало светлое.

Примечание — Животные отличаются более крупным размером и высокими показателями воспроизводства.

59 **хорек золотистый:** Порода хорьков, которая характеризуется черной окраской кроющих волос на фоне ярко-оранжевой подпуши.

60 **шиншилла:** Грызун семейства шиншилловых *(Chinchillidae),* типичный грызун небольшого размера, живой массой 0,5—1,0 кг, голова относительно большая, глаза и уши крупные, окраска спины голубовато-серая или коричневато-серая с черноватым оттенком, брюшная сторона беловатая; волосы имеют три зоны: темное основание, светлую среднюю зону и темные кончики, волосяной покров очень густой, мягкий, нежный, сильно опушен хвост, плодовитость от двух до четырех щенков.

Примечания

1 В клетках разводят малую шиншиллу (род *Chinchilla lanigera)*.

2 Генотип окраски дикой шиншиллы можно обозначить следующей формулой: *AABBblblCCeeMMPPSSwwVV*. Известно более 12 мутаций окраски волосяного покрова шиншилл.

61 **шиншилла стандартная:** Порода шиншилл, отличающаяся крупным размером, очень густым, уравненным и шелковистым опушением, общая окраска серая различной интенсивности с голубым оттенком, пигментированные кончики волос образуют темную вуаль, глаза черные.

Примечание — По интенсивности окраски шиншилл стандартных можно разделить на светлых, средних и темных. Тон окраски обусловлен длиной пигментированных кончиков остевых волос и шириной осветленной зоны.

62 **нутрия:** Млекопитающее семейства щетинистых крыс (*Echimyidae*), род нутрий (*Myocastor coypus*), среднего размера, живой массой 3,5—8,2 кг, волосяной покров густой, мягкий, с характерными длинными остевыми волосами, общая окраска изменяется от коричневой до темно-коричневой с различной степенью выраженности буроватых, желто-оранжевых, серых и даже фиолетовых оттенков, плодовитость от двух до восьми щенков.

Примечание — Общая окраска зависит от окраски кроющих волос и практически не зависит от окраски пуховых волос. Генотип стандартной окраски нутрии можно обозначить формулой *AABBCCffHHKKPPTTvvwwzz*. Известно более 11 мутаций окраски волосяного покрова нутрий.

63 **нутрия стандартная:** Порода нутрий, окраска которых отличается большой изменчивостью и варьируется от серовато-коричневой до темно-коричневой или бурой, брюшко светлее спины, большинство кроющих волос зонально окрашено, на брюшке у кроющих волос темное основание и осветленная вершина, на спине имеются также сплошь пигментированные волосы и волосы с осветленным кольцом и темными основаниями и вершинами, окраска осветленной зоны варьируется от светло-желтой до светло-коричневой с различными оттенками, по длине осветленной зоны и пигментированных кончиков остевых волос также имеется большое разнообразие, подпушь в основном коричневая различной интенсивности и оттенков, глаза коричневые, носовое зеркало депигментировано.

Примечание — Нутрия стандартная получена в результате селекции нутрий дикого типа.

64 **нутрия белая итальянская:** Порода нутрий, окраска которых почти белая с кремовым оттенком, подпушь светло-кремовая, кожа на лапах, хвосте и носовом зеркале розовая, вибрисы белые, глаза коричневые.

Примечание — Нутрии белые итальянские не отличаются по показателям продуктивности от животных стандартной породы.

65 **нутрия снежная:** Порода нутрий белой окраски, полученных путем скрещивания нутрий лимонных с белыми итальянскими, бежевыми и перламутровыми.

Примечание — Нутрии снежные могут иметь генотип t^st^sVv, t^at^aVv или t^at^sVv. Внутри указанных генотипов животные фенотипически неотличимы, имеют чисто-белую окраску волосяного покрова и коричневые глаза.

66 **нутрия бежевая:** Порода нутрий, окраска которых варьируется от серо-бежевой до темно-бежевой, почти коричневой, кроющие волосы в основном зонально окрашены и имеют коричневое основание и белую вершину, окраска подпуши варьируется от светло-бежевой до коричневой, светлая зона на фоне более темной подпуши создает впечатление серебристости, окраска носового зеркала, кожи лап и хвоста коричневая, глаза коричневые.

Примечание — По показателям продуктивности нутрии бежевые не уступают стандартным.

67 **нутрия перламутровая:** Порода нутрий серо-бежевой окраски, которые сходны по окраске с бежевыми, но более светлого тона, с меньшей выраженностью зональности окраски кроющих волос.

68 **нутрия золотистая:** Тип стандартной породы желто-золотистой окраски, окраска подпуши на спине ярко-желтая, на брюшке светло-желтая с розоватым оттенком, кожа на лапах и хвосте розовая, вибрисы белые, носовое зеркало коричневое, глаза коричневые.

69 **нутрия черная:** Порода нутрий с черной остью, темно-серой подпушью и зонально окрашенным волосом на боках, кожа на носу, лапах и хвосте темно-коричневая, почти черная, вибрисы черные или белые, глаза коричневые.

70 **нутрия майская:** Тип стандартной породы нутрий, окраска темно-коричневая, с кроющими волосами коричневого и темно-коричневого цвета, подпушь с голубым оттенком.

Примечание — Отличительной особенностью нутрий данного типа является их приспособленность для разведения в закрытых помещениях.

71 **нутрия пастелевая:** Порода нутрий коричневой окраски различной интенсивности, от светлой до темной, с нерезко выраженной зональностью окраски остевых волос, равномерно окрашенным бежевым пухом и коричневыми глазами.

Примечание — Нутрии пастелевые получены при скрещивании нутрий черных с белыми итальянскими, бежевыми и перламутровыми. Нутрии пастелевые могут иметь следующие генотипы: t^at^aZZ, t^at^aZz, t^St^SZZ, t^St^SZz, t^at^SZZ, t^at^SZz.

72 **сурок:** Крупный грызун семейства беличьих *(Sciuridae)*, среднего размера, живая масса которого составляет 3,0—6,0 кг, тело толстое, на коротких, сильных лапах, с крупными когтями, голова большая, уплощенная, шея короткая, хвост короткий, волосяной покров относительно густой и пышный, остевые волосы толстые, прямые и длинные, окраска волосяного покрова желтовато-коричневая различной интенсивности, окраска вершин пуховых и светлой зоны остевых волос варьируется от кремовой до ярко-оранжевой, основание подпуши серое, пигментированные кончики остевых волос темно-серые, коричневые или черные, образуют вуаль и темный ремень на хребте, плодовитость составляет четыре — шесть щенков.

Примечание — На звероферме разводят степного сурка (*Marmota bobak*).

73 **рысь:** Ценный пушной зверь семейства кошачьих *(Felidae)*, род рысей (*Felis lynx*), крупное животное, живая масса которого составляет 16—40 кг, телосложение плотное, туловище относительно короткое, хвост короткий, голова небольшая, округлая, по бокам присутствуют удлиненные волосы, морда короткая, глаза широкие, зрачки круглые, уши в основании широкие, на кончиках длинные кисточки, конечности длинные и сильные, лапы крупные, с очень широкими пальцами, желательный тип окраски голубовато-пепельный, волосяной покров с ярко очерченной пятнистостью, плодовитость составляет от одного до четырех котят.

Разведение пушных зверей

74 **звероводство:** Животноводческая отрасль сельского хозяйства, осуществляющая сезонное производство пушнины методом клеточного разведения пушных зверей.

75 **убойный молодняк;** *товарный молодняк пушных зверей* (Нрк. *забойный молодняк, меховой молодняк пушных зверей*): Пушные звери, предназначенные для убоя и получения от них шкурок.

76 **ремонтный молодняк** (Нрк. *товарное стадо*): Племенной молодняк пушных зверей, вводимый в основное стадо взамен выбракованных животных.

77 **полигамная способность самцов:** Способность самца пушных зверей спариваться в течение одного сезона с несколькими самками.

78 **пропустовавшая самка** (Нрк. *пустая самка*): Самка пушных зверей, покрытая самцом, но не давшая приплода.

79 **прохолостевшая самка** (Нрк. *прохолоставшая самка пушных зверей, холостая самка пушных зверей*): Самка пушных зверей, не покрытая самцом в период гона.

80 **основная самка** (Нрк. *штатная самка пушных зверей*): Самка основного стада пушных зверей, пошедшая в гон.

81 **гон:** Период спаривания половозрелых самцов с самками, продолжительность и сроки которого зависят от вида, возраста, генетических особенностей животных и таких паратипических факторов, как кормление, содержание, температура воздуха, уровень освещения.

82 **половой цикл:** Комплекс морфофизиологических изменений, периодически повторяющихся в организме половозрелых самок, связанный с размножением.

83 **течка:** Период половой активности самок, в который растут и развиваются фолликулы в яичниках.

84 **охота:** Период во время течки, когда созревшие, готовые к оплодотворению яйцеклетки выходят из яичников.

85 **ручное спаривание:** Естественное спаривание под контролем человека, при котором самец и самка, содержащиеся раздельно, ссаживаются в одну клетку для покрытия.

86 **искусственное осеменение:** Введение взятой заблаговременно спермы самца в половые пути самки искусственным методом.

Примечание — Применяется в основном у лисиц и песцов.

87 **щенение пушных зверей:** Роды у самок пушных зверей.

88 **неблагополучные роды:** Щенение пушных зверей, при котором все щенки рождаются мертвыми или погибают до регистрации (45 дней).

89 **плодовитость самки:** Число живых и мертвых щенков, родившихся у самки пушных зверей за одно щенение.

90 **линия:** Поколения самцов, происходящих от общего предка (самца) и отличающихся общими качествами, характерными для родоначальника.

91 **семейство:** Поколения самок, происходящих от общего предка (самки) и отличающихся общими качествами, характерными для родоначальницы.

92 **порода:** Динамически развивающийся генофонд однородной группы животных, имеющей общее происхождение, созданной человеком для осуществления его хозяйственной деятельности, отличающейся передаваемыми по наследству признаками.

93 **тип:** Структурная единица породы, внутрипородная группа зверей (которая при явном отличии от исходной породы наследует наиболее существенные признаки ее стандарта), характеризующаяся заметными различиями в телосложении, продуктивности, устойчивости к заболеваниям и другим неблагоприятным условиям среды (вызванными применением таких методов, как индивидуальный отбор, вводное скрещивание, генная инженерия).

94 **популяция:** Совокупность животных одного вида, обитающих на определенной территории, спаривание которых с особями других популяций ограничено факторами искусственного или естественного отбора.

95 **племенное ядро:** Группа лучших животных в стаде по родословной, адаптивной, продуктивной, репродуктивной характеристикам, предназначенная для воспроизводства и получения высококачественного молодняка.

96 **выход щенков:** Экономический показатель, характеризующий продуктивность зверей, рассчитываемый путем деления числа полученных к отсадке живых щенков на число самок основного стада.

97 **деловой выход щенков:** Экономический показатель, характеризующий продуктивность зверей, рассчитываемый путем деления числа полученных живых щенков на 1 ноября (на время убоя) на число самок основного стада.

98 **сохранность:** Показатель, определяемый отношением количества конечного поголовья у зверей к начальному за определенный период, выраженный в процентах.

99 **падеж:** Показатель, определяемый отношением количества павших зверей за определенный период к начальному поголовью, выраженный в процентах.

100 **среднесуточный прирост живой массы:** Расчетный показатель, характеризующий интенсивность роста молодняка, вычисленный за определенный промежуток времени, пересчитанный на величину увеличения живой массы за сутки.

101 **племенной завод:** Организация по племенному звероводству, располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы и использующая чистопородное разведение племенных животных с применением научно обоснованных селекционных и биотехнологических методов для комплектования собственного стада и реализации производителей и самок племенным репродукторам и другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

102 **племенной репродуктор:** Организация по племенному звероводству, которая осуществляет чистопородное разведение племенных животных с использованием научно обоснованных методов селекции и воспроизводства стада, имеет селекционный план работы для комплектования собственного стада и реализации племенного молодняка в звероводческие хозяйства разной формы собственности.

103 **генофондное хозяйство:** Организация по племенному звероводству, осуществляющая разведение и сохранение животных малочисленных, исчезающих видов и пород, представляющих собой источник генетического материала для создания (выведения) новых пород и типов пушных зверей и поддержания биоразнообразия животного мира, использующая метод чистопородного разведения животных; скрещивание не допускается.

104 **селекционно-генетический центр:** Организация по племенному звероводству, располагающая стадом высокопродуктивных чистопородных животных, осуществляющая деятельность по чисто-

породному разведению животных и/или использованию племенного материала (семени, эмбрионов) в селекционных целях.

105 **товарное хозяйство:** Организация по звероводству, осуществляющая производство высококачественной пушнины, проводящая селекционную работу в племенном ядре, обеспечивая ремонт своего стада при одновременном улучшении или поддержании продуктивных и племенных качеств животных.

106 **бонитировка:** Индивидуальная комплексная оценка зверей по породности, размеру и телосложению животного, качеству волосяного покрова, его окраски и интенсивности, а также принятым для данного вида (породы, типа) дополнительным признакам.

107 **племенная работа:** Комплекс зоотехнических, селекционных и организационных мероприятий, направленных на поддержание и совершенствование хозяйственно-полезных признаков и племенных качеств животных.

108 **селекционная работа:** Комплекс мероприятий, включающий отбор и подбор пушных зверей по фенотипу, генотипу с целью консолидации, совершенствования существующих признаков и создания животных с новыми полезными признаками.

109 **генотип:** Совокупность генов, локализованных в хромосомах, определяющих племенную и селекционную ценность, а также норму реакции на все возможные условия среды.

110 **генофонд:** Совокупность аллельных вариантов генов, встречающихся с определенной частотой у однородной популяции животных, имеющих общее происхождение.

111 **половой диморфизм:** Отличие самцов от самок одного вида по окраске, размерам и экстерьерным признакам.

112 **наследуемость:** Процесс передачи наследственных признаков или наследственной информации от одного поколения другому.

113 **ремонт стада:** Частичная или полная замена стада взрослых зверей молодняком, специально выращенным для этой цели.

114 **селекционируемые признаки:** Признаки, по которым осуществляют отбор зверей.

115 **селекционный эффект:** Разница между средними уровнями признака у молодняка текущего года и предшествующего, рассчитываемая как отношение селекционного дифференциала (проявление признака у отобранных родителей по сравнению со средним значением у группы, из которой они отобраны) с учетом коэффициента наследуемости.

116 **скрещивание:** Метод разведения, при котором происходит спаривание животных из генетически разных популяций, чаще всего из линий и пород.

117 **качественные признаки:** Признаки, контролируемые одним или несколькими генами, действие которых отчетливо ограничено от действия наследственных факторов, различия по этим признакам устанавливаются непосредственно путем наблюдения или сравнения, без измерения или взвешивания, качественные признаки обладают прерывистой изменчивостью, которая описывается по принципу «есть — нет», при гибридизации качественные признаки наследуются в основном согласно законам Менделя.

118 **количественные признаки:** Признаки, контролируемые совместным действием большого числа генов и обладающие непрерывной изменчивостью, которая учитывается с помощью измерений и может быть описана по принципу «больше — меньше».

119 **фенотип:** Проявление внешних признаков организма, формирующееся на основе генотипа в процессе индивидуального развития, которое является одним из вариантов нормы реакции организма на воздействие внешней среды, характеризуется изменчивостью.

120 **мутации:** Внезапные естественные (спонтанные) или вызванные искусственно (индуцированные) стойкие изменения наследственных структур (генов, хромосом), а также обусловленные ими различные изменения свойств и признаков организма.

Содержание пушных зверей

121 **шед:** Конструкция, состоящая из навеса с двухскатной крышей и установленными под ним в несколько рядов клетками для пушных зверей.

122 **клетка:** Конструкция, состоящая из деревянного домика и сетчатого выгула, в которой содержатся пушные звери.

123 **домик:** Часть клетки, соединенная с выгулом или вставляемая в нее (лисица, песец) для укрытия пушных зверей от непогоды и щенения самок.

124 **выгул:** Часть клетки, предназначенная для моциона, кормления и поения пушных зверей.

125 **гнездо:** Отделение в домике, вставное или постоянное, в котором самка пушных зверей щенится и вскармливает приплод.

126 **лаз:** Отверстие в стенке домика, через которое пушной зверь выходит в выгул.

127 **кормушка:** Емкость для корма.

128 **рацион:** Набор кормов, взятых в количестве и соотношении, соответствующих норме суточной потребности зверя в обменной энергии, питательных веществах (протеине, жире, углеводах), минеральных веществах, витаминах в соответствии с физиологическим состоянием животного.

Примечание — Структура рациона (соотношение кормов) зависит от возраста зверей.

129 **корма:** Продукты животного, растительного, минерального, синтетического и микробиологического происхождения и их различные сочетания, используемые в кормлении пушных зверей.

130 **тип кормления:** Совокупность технологических регламентов и режимов использования кормов для пушных зверей.

131 **безазотистые экстрактивные вещества;** БЭВ: Большая группа растворимых углеводов, продуктов углеводного обмена в растительном и животном организмах.

Примечание — К группе БЭВ относят сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза), крахмал, инулин, гемицеллюлозы (пентозаны — производные пентоз и гексозаны, образованные гексозами), пектиновые вещества и сходные с ними слизи и камеди, а также лигнин, гликозиды, дубильные вещества, некоторые пигменты растений. Содержание БЭВ в кормах определяют обычно вычитанием из общей массы питательных веществ (100 %) содержания сырого протеина, жира, клетчатки, золы и воды; количество отдельных БЭВ в кормах устанавливают в лабораторных условиях.

132 **углеводы:** Полиоксикарбоксильные соединения с общей формулой CH_2O, а также многочисленные производные этих соединений, объединяющие БЭВ и нерастворимые углеводы (клетчатка и гемицеллюлоза).

133 **антиокислители [антиоксиданты]:** Природные (витамины Е, С, К, А) и синтетические (агидол, дилудин, фенозан, кормолан и др.) ингибиторы окисления органических соединений, применяемые для стабилизации жировых и других легкоокисляющихся компонентов кормов.

134 **белки:** Высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот.

Примечание — Белки принято делить на простые и сложные. Простые белки состоят только из аминокислот. В состав сложных белков наряду с аминокислотами могут входить углеводы (гликопротеины), липиды (липопротеины), металлы (металлопротеины) и т. д. Белки входят в состав клеток, выполняя каталитические (ферменты), регуляторные (гормоны), транспортные (гемоглобин) и защитные (антитела) функции, а также функции преобразования различных видов энергии.

135 **сырой протеин:** Общее количество азотсодержащих соединений белковой природы в корме.

Примечание — В звероводстве термины «белок» и «протеин» отождествляют, так как количество небелкового азота в рационе пушных зверей незначительно.

136 **ферменты:** Специфические белки, содержащиеся во всех живых организмах и играющие роль биологических катализаторов; с помощью ферментов осуществляется обмен веществ и энергии в организме.

137 **жиры:** Триглицериды, полные сложные эфиры глицерина и одноосновных неразветвленных высших жирных кислот с четным числом углерода, хорошо растворимые в неполярных растворителях.

138 **обменная энергия;** ОЭ: Количество энергии, усвоенное животными после переваривания органических веществ корма (рациона), которое является научно обоснованным критерием энергетической оценки питательности кормов и выражением энергетической потребности животных.

139 **витамины:** Низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые для осуществления жизненно важных биохимических и физиологических процессов в живых организмах.

Примечание — Жирорастворимые витамины групп A, D, E, K, F (депонируемые) накапливаются в организме, преимущественно в жировой ткани и печени. Водорастворимые витамины групп B, C, P, H (недепонируемые) не накапливаются в тканях и достаточно быстро выводятся из организма. Водорастворимые витамины должны поступать в организм систематически.

140 **минеральные вещества:** Химические элементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма.

Примечание — По количественному признаку минеральные элементы делят на три группы: макроэлементы (Ca, P, K, Na, S, Cl, Mg), микроэлементы (Fe, Zn, F, Sr, Mo, Cu, Br, Si, Cs, J, Mn, Al, Pb, Cd, B, Rb) и ультрамикроэлементы (Se, Co, V, Cr, As, Ni, Li, Ba, Ti, Ag, Sn, Be, Ga, Ge, Hg, Sc, Zr, Bi, Sb, U, Th, Rh). Макроэлементы являются структурными элементами тканей, обеспечивают кислотно-щелочное равновесие внутренних сред организма, регулируют водно-солевой обмен, микро- и ультрамикроэлементы играют специфическую биологическую роль в ферментативных реакциях, участвуют в генной и метаболической регуляции.

141 **биологически активные вещества;** БАВ: Химические вещества, которые при небольших концентрациях обладают высокой физиологической активностью по отношению к определенным группам живых организмов или к отдельным группам их клеток.

142 **биологически активные добавки;** БАД: Композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

143 **комбикорма:** Однородные смеси кормовых средств, составленные по научно обоснованным рецептам, предназначенные для определенного вида и производственной группы животных и обеспечивающие наиболее эффективное использование содержащихся в них питательных веществ.

144 **балансирующие кормовые добавки:** Концентраты протеинов, витаминов, ферментов, микродобавок, рассчитанные для конкретных животных в разные периоды их жизни и являющиеся не основным кормом, а лишь частью, не превышающей 10 %—30 % массы основного корма.

145 **полнорационный комбикорм:** Комбикорм, полностью обеспечивающий потребность животных в питательных, минеральных и биологически активных веществах и предназначенный для скармливания в качестве единственного корма.

146 **эталонный белок;** *идеальный белок*: Белок с наивысшим коэффициентом переваримости, состав которого идеально удовлетворяет физиологическую потребность организма в незаменимых аминокислотах.

Примечание — Для плотоядных пушных зверей это белок филе трески.

147 **норма кормления:** Количество энергии, питательных и биологически активных веществ, удовлетворяющих потребности животных на поддержание жизни, образование продукции, проявление воспроизводительных функций и сохранение здоровья в условиях конкретной технологии производства.

Примечание — Нормированное кормление обеспечивает рациональное использование кормов.

148 **полноценность корма:** Качественный показатель, характеризующий способность кормов обеспечить физиологические потребности организма пушных зверей.

149 **липиды:** Группа природных соединений, включающая жиры, масла и жироподобные вещества.

Примечание — Подразделяют на простые (жиры, масла, воск) и сложные (липопротеины, содержащие белок; гликолипиды, содержащие углеводы; фосфолипиды и др.).

150 **оплата корма:** Показатель, отражающий количество продукции, полученной от животных, в расчете на единицу потребленного ими корма, определяемый делением количества продукции, полученной от животных за определенный период, на количество кормов (выраженных в энергетических единицах), потребленных за этот период.

151 **кормокухня;** *кормоцех*: Помещение с кормообрабатывающими и кормоприготовительными машинами, в котором производится переработка и приготовление кормов для пушных зверей.

Продукция звероводства

152 **пушнина** (Нрк. *меховое сырье, меха*): Невыделанные шкурки пушных зверей, разводимых в звероводческих хозяйствах или добытых на охоте.

153 **шкурка пушного зверя:** Снятая с пушного зверя кожа с волосяным покровом.

154 **качество шкурки:** Совокупность свойств шкурки, определяемая ее размером, окраской, структурой волосяного покрова, сортностью и дефектностью.

155 **сорт шкурки:** Совокупность определенных товарных свойств пушной шкурки, характеризующих степень зрелости волосяного покрова и кожевой ткани.

156 **зачет по качеству:** Показатель качества пушнины в процентах, определяемый от стоимости шкурки, принимаемой соответствующим стандартом на сырье за 100 %.

157 **нормальная шкурка:** Шкурка без дефектов или с дефектами, допускаемыми стандартом.

158 **дефекты шкурки** (Нрк. *пороки шкурки*): Повреждения волосяного покрова и кожевой ткани, возникшие при жизни пушного зверя, в процессе его убоя, съемки, первичной обработки, хранения и транспортирования шкурки.

159 **дефектность шкурки:** Степень повреждения шкурки с учетом размера дефектов.

160 **сеченность волосяного покрова** (Нрк. *битость волосяного покрова*): Дефект шкурки, возникший в результате обламывания вершин волос.

161 **ватность волосяного покрова** (Нрк. *самсоновость волосяного покрова*): Дефект шкурки, выражающийся в изреженности или укороченности кроющих волос, которые по длине меньше пуховых.

162 **глухая шкурка:** Шкурка пушных зверей, у которой все или почти все кроющие волосы сплошь пигментированы.

163 **закрученность вершин кроющих волос** (Нрк. *паленость волоса*): Дефект шкурки, заключающийся в изогнутости и расщепленности концов кроющих волос.

164 **закусы:** Рубцы на кожевой ткани, образующиеся во время драк пушных зверей, при зарастании которых на коже видны небольшие пигментированные пятна.

165 **красноводость шкурки:** Дефект шкурки стандартной норки, выражающийся в наличии красновато-бурого оттенка в окраске кроющих и вершин пуховых волос.

166 **открытая подпушь** (Нрк. *открытый мех*): Дефект шкурки, заключающийся в плохом покрытии подпуши остевыми волосами.

167 **плоский волосяной покров** (Нрк. *плоский мех*): Дефект шкурки, выражающийся в почти горизонтальном положении кроющих волос вследствие недостаточной густоты подпуши.

168 **подмокание:** Дефект шкурки, заключающийся в наличии повреждений волосяного покрова и кожевой ткани на каудальной трети черева в результате расстройства мочеотделения у зверя.

169 **изреженность [поредение] волосяного покрова:** Дефект шкурки, проявляющийся в уменьшении количества волос на всей шкурке или отдельных ее участках.

170 **свалянность волосяного покрова** (Нрк. *свойлачиваемость волосяного покрова*): Дефект шкурки, характеризующийся спутанностью волос вплоть до образования войлокообразных комков.

171 **развал волос:** Дефект шкурки лисицы, характеризующийся образованием проборов волосяного покрова на разных участках.

172 **сквозняк** (Нрк. *сквозной волос*): Дефект шкурки, заключающийся в обнаженности корней волос со стороны кожевой ткани, образующийся в результате неправильной обезжировки шкурки при первичной обработке.

173 **стриженый волосяной покров:** Дефект шкурки, выражающийся в поврежденности волосяного покрова в результате обламывания вершин кроющих волос или скусывания их зверем.

174 **теклость волосяного покрова:** Дефект шкурки, возникающий при ослаблении связи волос с кожевой тканью, в результате чего волосы легко выпадают, появляющийся в результате сквозняка, прелин и иных факторов.

175 **грива у лисиц:** Наличие удлиненных кроющих волос на шее и лопатках лисицы.

176 **упругость волос пушных зверей:** Свойство волос пушных зверей после сминания, выпрямления и растягивания восстанавливать свое первоначальное положение.

177 **волосяной покров** (Нрк. *меховой покров, мех*): Волосы, расположенные на поверхности тела животного, представляющие собой нитевидные роговые придатки кожи, которые характеризуются густотой, длиной, основная функция которых — участие в теплорегуляции, метаболизме веществ и энергии организма.

Примечание — Волосяной покров пушных зверей складывается из волос нескольких категорий, отличающихся по размеру, форме, окраске и гистологическому строению.

178 **структура волосяного покрова:** Строение кроющих и пуховых волос пушных зверей и их соотношение по густоте, длине и толщине.

179 **пышность волосяного покрова:** Высота волосяного покрова пушных зверей, обусловливаемая его структурой, упругостью и углом залегания волос в коже.

180 **качество волосяного покрова:** Совокупность пышности, мягкости, блеска и целости волосяного покрова пушных зверей, определяющая товарную ценность шкурки.

181 **окраска волосяного покрова:** Сочетание цвета кроющих и вершин пуховых волос пушных зверей.

182 **чистота окраски волосяного покрова:** Степень выраженности желательных и нежелательных оттенков в окраске волосяного покрова пушных зверей.

183 **беломордость:** Рисунок на волосяном покрове лисиц и песцов, образуемый белыми пятнами на голове, шее, груди и переходящими на брюшко и передние лапы.

184 **вуаль у пушных зверей:** Зона пигментированных вершин кроющих волос пушных зверей на фоне светлой зоны остевых волос или более светлого пуха.

Примечание — Вуаль у серебристо-черных лисиц может быть нормальной, тяжелой или легкой, а у песцов и норок — более или менее выраженной.

185 **маска:** Симметричный, резко очерченный рисунок на морде пушного зверя.

186 **ремень:** Темная полоса вдоль спины зверя, образуемая пигментированными концами кроющих волос.

187 **тип у лисиц:** Белый кончик хвоста у лисиц.

188 **зонально окрашенные волосы** (Нрк. *зонарно окрашенные волосы*): Волосы пушных зверей, имеющие различно окрашенные зоны.

189 **платиновые волосы:** Остевые волосы пушных зверей, имеющие депигментированные середину, основание и пигментированную вершину.

190 **седые волосы:** Депигментированные (белые) волосы пушных зверей.

191 **серебристые волосы:** Темные остевые волосы с депигментированной зоной в верхней их части.

192 **серебристое кольцо:** Зональная окраска остевых волос, у которых вершина иссиня-черная, средняя часть чисто-белого цвета, основание темно-серое.

193 **открытое серебро:** Осветленность волосяного покрова в результате слишком близкого расположения серебристого кольца к вершинам остевых волос и слабого прикрытия этого кольца вуалью.

194 **процент серебристости:** Отношение длины участка шкурки (или тела зверя), сплошь занятого серебристым волосом, к общей длине шкурки (или тела зверя), выраженное в процентах.

195 **интенсивность серебристости:** Степень выраженности серебристости, обусловленная соотношением волос с разными зонами депигментации на спине и боках (шкурки) серебристо-черных лисиц.

196 **интенсивность платинового волоса:** Частота расположения платиновых волос на теле зверя.

197 **сортировка шкурок:** Подразделение шкурок пушных зверей в соответствии с действующим стандартом на товарные категории (порода, цвет, размер, сорт, группа дефектов).

198 **мездра:** Остатки на невыделанной шкурке подкожно-жировой клетчатки, прирезей мяса и хрящей, отделяемые от дермы при первичной обработке.

199 **густота волосяного покрова шкурок:** Совокупное количество волос различных категорий на единице площади шкурки.

200 **самопогрызание:** Покусы кожи с неровной, ступенчатой стриженностью волосяного покрова на хвосте, бедрах шкурки.

201 **плохо обезжиренная шкурка:** Жировая пленка или пятна жира на шкурке.

202 **дыры:** Потери части поверхности шкурки при ее первичной обработке.

203 **плешины:** Участки шкурки, лишенные волосяного покрова.

204 **склянность:** Сильная засушенность кожевой ткани.

205 **битость ости:** Разрушение концов остевых волос до уровня пуха, что приводит к свалянности волоса.

206 **быглость:** Вымороженная кожевая ткань, имеющая белый цвет в результате консервирования на морозе.

207 **окровавленность волоса:** Запекшаяся кровь на волосе.

208 **слипшийся волосяной покров:** Склеивание волос в результате их загрязнения.

209 **признаки линьки:** Потускнение волоса, потемнение кожевой ткани со стороны кожевой ткани, при прочесывании волоса против потока или его выдергивании он легко отделяется.

Алфавитный указатель терминов

антиокислители 133
антиоксиданты 133
БАВ 141
БАД 142
белки 134
белок идеальный 146
белок эталонный 146
беломордость 183
битость волосяного покрова 160
битость ости 205
бонитировка 106
быглость 206
БЭВ 131
ватность волосяного покрова 161
вещества биологически активные 141
вещества минеральные 140
вещества экстрактивные безазотистые 131
витамины 139
волос сквозной 172
волосы зонально окрашенные 188
волосы зонарно окрашенные 188
волосы платиновые 189
волосы седые 190
волосы серебристые 191
вуаль у пушных зверей 184
выгул 124
выход щенков 96
выход щенков деловой 97
генотип 109
генофонд 110
гнездо 125
гон 81
грива у лисиц 175
густота волосяного покрова шкурок 199
дефектность шкурки 159
дефекты шкурки 158
диморфизм половой 111
добавки биологически активные 142
добавки кормовые балансирующие 144
домик 123
дыры 202
жиры 137
завод племенной 101
закрученность вершин кроющих волос 163
закусы 164
зачет по качеству 156
звероводство 74
изреженность волосяного покрова 169
интенсивность платинового волоса 196
интенсивность серебристости 195
качество волосяного покрова 180
качество шкурки 154
клетка 122

кольцо серебристое 192
комбикорма 143
комбикорм полнорационный 145
корма 129
кормокухня 151
кормоцех 151
кормушка 127
красноводость шкурки 165
лаз 126
линия 90
липиды 149
лисица 30
лисица арктический мрамор 36
лисица бургундская 41
лисица жемчужная 40
лисица коликотт 42
лисица красная рощинская 38
лисица огневка вятская 39
лисица платиновая 33
лисица серебристо-черная 31
лисица снежная 35
маска 185
мездра 198
мех 177
меха 152
мех открытый 166
мех плоский 167
молодняк забойный 75
молодняк пушных зверей меховой 75
молодняк пушных зверей товарный 75
молодняк ремонтный 76
молодняк убойный 75
мутации 120
наследуемость 112
норка 1
норка алеутская 15
норка алеутская стальная 23
норка альбинопастель 29
норка ампалосапфир 26
норка ампалосеребристая 21
норка белая хедлунд 16
норка джет черная 7
норка коричневая 5
норка крестовка 8
норка мойлалеутская 22
норка мойлпастельсеребристая 27
норка мойлсапфир 25
норка орхидпастель 20
норка паломино американское 13
норка пастель 11
норка пятнистая куйтежская 12
норка рощинская пестрая 17
норка сапфир 24
норка серебристо-голубая 14

норка снежный топаз 19
норка соболиная темно-коричневая 10
норка соклотпастель 18
норка соклотпастельсеребристая 28
норка стандартная 2
норка темно-коричневая 4
норка черная 6
норка черный хрусталь 9
норки цветные 3
норма кормления 147
нутрия 62
нутрия бежевая 66
нутрия белая итальянская 64
нутрия золотистая 68
нутрия майская 70
нутрия пастелевая 71
нутрия перламутровая 67
нутрия снежная 65
нутрия стандартная 63
нутрия черная 69
окраска волосяного покрова 181
окровавленность волоса 207
оплата корма 150
осеменение искусственное 86
охота 84
ОЭ 138
падеж 99
паленость волоса 163
песец 43
песец вуалевый 46
песец кольский 45
песец пушкинский 48
песец родниковский тень 47
песец серебристый 44
плешины 203
плодовитость самки 89
подмокание 168
подпушь открытая 166
покров волосяной 177
покров волосяной плоский 167
покров волосяной слипшийся 208
покров волосяной стриженый 173
покров меховой 177
полноценность корма 148
популяция 94
поредение волосяного покрова 169
порода 92
пороки шкурки 158
признаки качественные 117
признаки количественные 118
признаки линьки 209
признаки селекционируемые 114
прирост живой массы среднесуточный 100
протеин сырой 135

процент серебристости 194
пушнина 152
пышность волосяного покрова 179
работа племенная 107
работа селекционная 108
развал волос 171
рацион 128
ремень 186
ремонт стада 113
репродуктор племенной 102
роды неблагополучные 88
рысь 73
самка основная 80
самка пропустовавшая 78
самка прохолостевшая 79
самка пустая 78
самка пушных зверей прохолоставшая 79
самка пушных зверей холостая 79
самка пушных зверей штатная 80
самопогрызание 200
самсоновость волосяного покрова 161
свалянность волосяного покрова 170
свойлачиваемость волосяного покрова 170
семейство 91
серебро открытое 193
сеченность волосяного покрова 160
сквозняк 172
склянность 204
скрещивание 116
собака енотовидная 49
собака енотовидная стандартная 50
соболь 51
соболь пушкинский янтарный 53
соболь салтыковский серебристый 55
соболь салтыковский 1 54
соболь черный 52
сорт шкурки 155
сортировка шкурок 197
сохранность 98
спаривание ручное 85
способность самцов полигамная 77
стадо товарное 76
структура волосяного покрова 178
сурок 72
сырье меховое 152
теклость волосяного покрова 174
течка 83
тип 93
тип кормления 130
тип лисиц бирюлинский 37
тип лисиц пушкинский 32
тип лисиц савватьевский 34
тип у лисиц 187
углеводы 132

упругость волос пушных зверей 176
фенотип 119
ферменты 136
форма енотовидной собаки одомашненная 50
хозяйство генофондное 103
хозяйство товарное 105
хорек 56
хорек золотистый 59
хорек тверской 57
хорек тверской пастелевый 58
центр селекционно-генетический 104
цикл половой 82
чистота окраски волосяного покрова 182
шед 121
шиншилла 60
шиншилла стандартная 61
шкурка глухая 162
шкурка нормальная 157
шкурка плохо обезжиренная 201
шкурка пушного зверя 153
щенение пушных зверей 87
энергия обменная 138
эффект селекционный 115
ядро племенное 95

УДК 636.93:636/639:006.354 ОКС 01.020

Ключевые слова: термин, определение, пушные звери, звероводство, виды, породы, типы, разведение, содержание, продукция звероводства

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 20.06.2025. Подписано в печать 25.06.2025. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru