ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 55305— 2012

ШКУРКИ СОБОЛЯ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2014

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии от 29 ноября 2012г. №1529-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШКУРКИ СОБОЛЯ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Undressed skins of farmed sable. Specifications

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки соболя клеточного разведения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12266–89 Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **бунт шкурок:** Увязанные по 10 штук (шкурки с сединой по 5 штук) шкурки соболя, подобранные по размеру, сорту, цвету, интенсивности седины и категории дефектности.

3.2 **головка:** Шкурка соболя 6 размера, первого сорта, первой группы пороков, первого цвета, стоимость которой принимается за 100 %.

3.3 **дефектность шкурки:** Степень поврежденности шкурки.

3.4 **дефекты (пороки) шкурки:** Повреждения волосяного покрова и мездры, возникшие при жизни пушного зверя, в процессе его убоя, съемки, первичной обработки, хранения и транспортирования шкурки.

3.5 **душка:** Топографический участок шкурки, расположенный на нижней стороне шеи.

3.6 **зачет по качеству:** Показатель качества шкурки, определяемый от зачетной стоимости шкурки, принимаемой за 100 %.

3.7 **качество волосяного покрова:** Совокупная оценка пышности, шелковистости, блеска и целости волосяного покрова, определяющая товарную ценность шкурки.

3.8 **качество шкурки:** Совокупность свойств шкурки, определяемая ее размером, окраской, структурой волосяного покрова, сортностью и дефектностью.

3.9 **интенсивность седины:** Частота встречаемости депигментированных волос на поверхности волосяного покрова шкурки.

Издание официальное

3.10 **мездра:** Внутренняя сторона кожевой ткани после снятия с сырой шкурки подкожного жирового слоя.

3.11 **необезжиренность:** Наличие на мездре шкурки слоя подкожных жировых отложений.

3.12 **несортовая шкурка:** Шкурка, не отвечающая по сортности требованиям стандарта на соответствующий вид сырья.

3.13 **окраска волосяного покрова:** Сочетание цвета кроющих и вершин пуховых волос на шкурке.

3.14 **пышность волосяного покрова:** Высота волосяного покрова шкурки, обусловливаемая его структурой, упругостью и углом залегания волос в коже.

3.15 **седые волосы:** Депигментированные волосы на шкурке.

3.16 **сорт шкурки:** Совокупность определенных товарных свойств пушной шкурки, характеризующих степень спелости волосяного покрова и мездры.

4 Технические требования

4.1 Шкурки соболя должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.2 Шкурки соболя должны иметь густой, шелковистый и хорошо развитый волосяной покров. На череве волосяной покров может быть реже, чем на других участках шкурки. На голове и шейной части пуховые и остевые волосы короче. На душке допускается наличие осветленного волосяного покрова и небольшого горлового пятна.

4.3 Шкурки должны быть сняты с тушек «трубкой» с разрезом от пальцевых мякишей по внутренней стороне задних лап по линии соединения потоков волосяного покрова огузка и черева, с дополнительным разрезом по передним конечностям от подушечек до скакательного сустава и нижней поверхности хвоста, с сохранением меха головы (с носиками и ушами), хвоста и лап. Шкурки должны быть очищены от костей из лап и хвоста, от прирезей мяса, сухожилий и хрящей, от грязи и крови, хорошо обезжирены без повреждения корней волос и посажены (без складок, морщин и подтяжки) на правилки (см. приложение А). После съемки задние и передние лапы должны быть расправлены в длину и ширину и оправлены пластом. При правке хвост припосаживают в длину и симметрично растягивают в ширину. Шкурки оправляют на правилки мездрой наружу и консервируют пресно-сухим способом.

Шкурки после сушки должны быть вывернуты волосом наружу.

4.4 Подразделение шкурок на размеры

В зависимости от длины и ширины шкурки соболя подразделяют на размеры в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Показатели категории размеров шкурок соболя

Размер	Длина, см	Ширина, см, не менее	Площадь, $дм^2$, не менее
00	62,5 – 64,9	8,0	10,00
0	60,0 – 62,4	8,0	9,60
1	57,5 – 59,9	7,5	8,62
2	55,0 – 57,4	7,5	8,25
3	52,5 – 54,9	7,5	7,87
4	50,0 – 52,4	7,5	7,50
5	47,5 – 49,9	7,5	7,12
6	45,0 – 47,4	7,0	6,30
7	42,5 – 44,9	7,0	5,95
8	40,0 – 42,4	7,0	5,60
9	37,5 – 39,9	7,0	5,25
10	35,0 – 37,4	6,5	4,55
11	32,5 – 34,9	6,5	4,22
12	30,0 – 32,4	6,5	3,90

4.5 Шкурки в зависимости от состояния волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка шкурок соболей по сортам

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
Первый	Шкурки полноволосые, шелковистые с развившейся густой блестящей остью и густым пухом. Хвост хорошо опушен. Кожевая ткань светлая. На хвосте и лапах допускается легкая синева
Второй	Шкурки менее полноволосые, шелковистые с недостаточно развившимися остью и пухом. Хвост менее опушен. Кожевая ткань с легкой синевой

4.6 Шкурки по цвету волосяного покрова должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Оценка шкурок соболей по окраске

Цвет	Характеристика окраски волосяного покрова для пород соболей	
	Черный	Салтыковская 1
Первый	Волосяной покров темный с черной остью и темно-серым, с голубоватым оттенком, пухом	Волосяной покров однотонный темно-коричневый. Ость темно-коричневая, пух темно-серый с голубоватым оттенком
Второй	Волосяной покров темный с почти черной или темно-коричневой остью. Пух темно-серый, допускаются темно-коричневые вершины волос	Волосяной покров темно-коричневый с легким буроватым оттенком. Пух темно-серый, допускается легкий коричневый оттенок
Третий	Волосяной покров коричневый, ость коричневая, пух серый	Волосяной покров коричневый, ость коричневая разной интенсивности. Пух серый разной интенсивности с каштановыми вершинами
Четвертый	Волосяной покров более светлый, с остью каштанового и песочного оттенков с осветленным пухом	Волосяной покров светло-коричневый с бурым или песочным оттенком с осветленным пухом

4.6.1 Для шкурок первого и второго цветов не допускается различие по цвету между черевом и остальной частью шкурки (за исключением осветления промежности на нижней четверти черева, см. приложение Б).

4.6.2 Для шкурок третьего цвета допускается различие по цвету между черевом и остальной частью шкурки.

4.6.3 Шкурки стандартной окраски с пятнами иного цвета на боках и череве относят ко второй группе качества.

4.6.4 Изменение цвета волосяного покрова в промежности при определении цвета шкурки не учитывают.

4.6.5 Белопухие шкурки относят к 3-й или 4-й группам пороков.

Примечание – Седину и горловое пятно при определении цвета не учитывают.

4.7 При оценке интенсивности седины волосяного покрова шкурки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Оценка интенсивности седины

Группа седины	Наличие седых волос на поверхности шкурки
1	Равномерное распределение седых волос на более 70 % поверхности шкурки
2	Наличие седых волос от 50 % до 70 % поверхности шкурки
3	Наличие седых волос от 30 % до 50 % поверхности шкурки
4	Наличие седых волос от 10 % до 30 % поверхности шкурки
5	Наличие седых волос до 10 % поверхности шкурки

4.8 Подразделение шкурок на группы пороков

В зависимости от наличия пороков шкурки соболя подразделяют на группы в соответствии с требованиями таблицы 5.

Таблица 5 – Оценка шкурок соболей по наличию пороков

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Разрывы и швы, общая длина, см	До 5	5,1–10	10,1—20	Более 20 до однократной длины шкурки
Дыры, битость, вытертые места и сеченость, % общей площади	До 5	5,1–10	10,1–15	15,1–20
Плешины, % общей площади	Не допускается	До 10	10,1–15	15,1–20
Сквозной волос, % общей площади	Не допускается	До 20	20,1–30	30,1–50
Подмокание, потертость на череве, общая площадь, $см^2$	До 3	3,1–10	10,1–30	Более 30
Отсутствие частей шкурки	1 лапа	2–3 лапы или хвост	Голова или 4 лапы	Голова с шеей или черево
Закусы, % общей площади	Отдельно расположенные	Кучные, до 4	Кучные, 4,1–8	Кучные, 8,1–20
Четко выраженная закрученность вершин остевых волос, % общей площади	Не допускается	До 3	3,1–20	Свыше 20
Потеря пигментации пуховых волос на шкурках первого цвета	Не допускается	Не допускается	Цвет пуховых волос резко ослаблен на основных частях шкурки	Цвет пуховых волос белый
Признаки весенней линьки	Не допускаются	Не допускаются	С незначительно поредевшей остью на бо-ках и череве	С поредевшей остью на боках и череве
Шкурки прелые, горелые, пораженные молью, кожеедом, летние, ранне-осенние, полуволосые, щенков с пухлявым волосом	Не допускаются			

4.8.1 При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учитывают один наибольший порок.

4.8.2 Пороки на голове, шее, хвосте и лапах оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей шкурки.

4.9 Соотношение пороков должно отвечать следующим требованиям:

4.9.1 На шкурках, относящихся ко второй группе пороков, допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

4.9.2 На шкурках, относящихся к третьей группе пороков, допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

4.9.3 На шкурках, относящихся к четвертой группе пороков, допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или одного порока третьей группы и одного – двух пороков второй группы, или трех пороков второй группы.

4.9.4 При отнесении шкурок ко второй, третьей или четвертой группам пороки, допущенные для первой группы, не учитывают.

4.9.5 К несортовым (браку) относят и оценивают с зачетом не более 35 % стоимости первого сорта соответствующих цвета и размера следующие шкурки:

- с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы;
- весенние и поздневесенние;
- со значительно поредевшим волосяным покровом или с выпадающим волосом;
- с желтой грубой мездрой;

- летние, с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха;
- осенние, полуволосые с синей мездрой;
- раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, почти без ости;
- молодняка с пухлявым волосом;
- прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом.

5 Методы контроля

5.1 Длину шкурки измеряют от кончика носа до основания хвоста, ширину – по линии, проходящей через середину длины шкурки, в сантиметрах.

5.2 Интенсивность седины определяют отношением площади участка шкурки, занятого «седым» волосом, к общей площади шкурки (в процентах).

5.3 Площадь шкурки определяют путем умножения длины на удвоенную ширину шкурки, в квадратных дециметрах.

5.4 Поредение ости на боках устанавливают в положении шкурки, перегнутой посередине хребта и черева.

5.5 Определение площади порока, в квадратных сантиметрах, проводят умножением показателей его длины в сантиметрах и ширины в сантиметрах.

5.6 Линейный порок измеряют в сантиметрах. Если поврежденные участки на шкурке имеют вид ломаных, изогнутых линий, то поврежденный участок вписывают в наименьший прямоугольник и определяют его размер в квадратных сантиметрах умножением длины и ширины поврежденного участка.

6 Обработка результатов

6.1 Зачетную стоимость шкурки вычисляют в процентах методом последовательных скидок или добавок к зачетной стоимости шкурки соболя 6 размера, первого сорта, второго цвета, первой группы пороков. При наличии на шкурке первого сорта седых волос к ее зачетной стоимости добавляются проценты в соответствии с группой седины и таблицей Г.2 приложения Г.

6.2 Зачетную стоимость партии шкурок, состоящей из шкурок разных размеров, сортов, цветов, интенсивности седины (при наличии на шкурке седых волос) и группы пороков, определяют по числу головок, соответствующему каждой качественной группе шкурок, а затем суммируют число головок по всем качественным группам шкурок данной партии.

6.3 Сорт шкурки определяют по состоянию кожно-волосяного покрова шкурки: развитости кроющих и пуховых волос, их блеска, шелковистости и густоты, опушенности хвоста, толщине и цвету кожевой ткани.

6.4 Определение зачетной стоимости шкурки – см. таблицы Г.1 – Г.2 приложения Г.

7 Правила приемки

7.1 Шкурки соболя принимают партиями. Партией считается любое число шкурок, оформленных одним документом о качестве.

7.2 Оценку качества шкурок соболя проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

8 Маркировка и упаковка

8.1 На каждой шкурке в области огузка проставляют клеймо зверохозяйства игольчатым штампом.

8.2 В бунты подбирают шкурки одного размера, сорта, цвета, группы седины и группы пороков и располагают их черевами в одну сторону.

8.3 Упаковку и маркировку шкурок проводят в соответствии с ГОСТ 12266. Каждый бунт пломбируют и биркуют.

Примечание – Запрещается в одну тару паковать шкурки, недостаточно обезжиренные в процессе первичной обработки и с зажиренным волосяным покровом (при хранении).

Шкурки в тару упаковывают, связанными в бунты. Шкурки укладывают ровными рядами. Каждый очередной ряд выкладывают головами в противоположную сторону.

9 Транспортирование

Шкурки соболя транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Приложение А
(справочное)

Правила для шкурок соболя



Приложение Б
(справочное)

Топография шкурки



Приложение В
(справочное)

Характеристика пороков, встречающихся на шкурках соболей

Таблица В.1 – Характеристика пороков, встречающихся на шкурках соболей

Наименование порока	Определение
Битость волосяного покрова	Появление на шкурке начальных признаков сваленности волосяного покрова, сопровождающееся изогнутостью, расщепленностью и обламыванием вершин кроющих волос
Вытертость волосяного покрова (вытертые места)	Участки волосяного покрова с обломанными стержнями волос в прикорневой части
Выхваты краев	Вырезы или отрывы краев частей шкурки, имеющих товарную ценность
Горелина (горелая шкурка, гарь жировая)	Потеря прочности и разрушение участков кожного покрова шкурки в результате окисления неудаленного жира, сопровождающиеся появлением красных и коричневых пятен
Дыра	Сквозное отверстие в кожевой ткани с потерей площади шкурки
Зажиренный волос	Загрязнение волосяного покрова жиром при первичной обработке шкурки
Закат	Загрязненные и склеенные пучки волос
Закрученность	Участки шкурки с четко выраженной закрученностью вершин кроющих волос
Закусы	Отверстия на кожевой ткани, иногда с кровоподтеками или болячками со стороны волосяного покрова
Кожеедина	Следы повреждения кожного покрова личинками и жуками кожееда в виде отверстий или несквозных канавок с неровными краями
Компенсационная линька	Процесс восстановления целостности волосяного покрова за счет роста новых волос на месте утерянных, сопровождающийся наличием темных пигментных пятен на мездровой поверхности
Ломина	Несквозной надлом кожевой ткани сухой шкурки со стороны волосяного покрова
Молеедина	Следы повреждения гусеницами моли на волосяном покрове и эпидермисе шкурки в виде углублений, извилистых ходов, изъеденных участков и съеденных волос
Недостача (отсутствие) частей шкурки	Отсутствие топографического участка шкурки или его части, имеющей товарную ценность
Ороговение	Превращение участков кожевенной ткани пресно-сухих шкурок в твердую, ломкую, роговидную массу
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (чесотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной первичной обработки или неправильного хранения шкурки
Подмокание	Повреждение волосяного покрова и кожи на каудальной трети черева в результате расстройства мочеотделения у зверя
Подрезь	Надрез кожевенной ткани шкурки с мездровой стороны более чем на 1/3 толщины дермы
Порез	Сквозной разрез кожного покрова шкурки
Потертость	Участки шкурки с изреженным волосяным покровом или с обломанными вершинами кроющих волос и пуха в результате механического воздействия
Потертость на череве	Участки шкурки на череве с изреженным волосяным покровом или с обломанными вершинами кроющих волос и пуха в результате механического воздействия
Прелины, теклость волоса	Разложение кожевой ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении, приводящее к теклости волоса
Признаки весенней линьки	Полноволосые шкурки с поредевшей остью на боках и череве
Разрыв, разрез	Линейные сквозные повреждения кожевой ткани шкурки без потерь ее площади
Сеченая ость	Участки шкурки с обломанными (обкусанными) остевыми, а иногда и пуховыми волосами

Окончание таблицы В1

Наименование порока	Определение
Сквозняк	Обнажение корней волос и выпадение их со стороны кожевой ткани
Теклость волосяного покрова	Выпадение волос в результате механического воздействия на кожевую ткань или ослабления связи волос с кожевой тканью в результате ее разложения
Трещина кожевой ткани	Разрыв эпидермиса и сосочкового слоя дермы
Цвелость волосяного покрова	Ослабление (потускнение) естественного цвета волосяного покрова под действием света
Шов	Линейные сквозные повреждения кожевой ткани, края которых сшиты нитками

Приложение Г
(справочное)

Таблицы расчетов оценки шкурок соболя

Т а б л и ц а Г. 1– Расчет зачета по качеству шкурок соболей, %

Размер	Цвет	1 сорт				2 сорт			
		1	2	3	4	1	2	3	4
00	1	135	121,5	108	94,5	108	97,2	86,4	75,6
	2	121,5	109,3	97,2	85,0	97,2	87,5	77,8	68,0
	3	108	97,2	86,4	75,6	86,4	77,8	69,1	60,5
	4	94,5	85,0	75,6	66,1	75,6	68	60,5	52,9
0	1	130	117	104	91	104	93,6	83,2	72,8
	2	117	105,3	93,6	81,9	93,6	84,2	74,9	65,5
	3	104	93,6	83,2	72,8	83,2	74,9	66,6	58,2
	4	91	81,9	72,8	63,7	72,8	65,5	58,2	51
1	1	125	112,5	100	87,5	100	90	80	70
	2	112,5	101,2	90	78,7	90	81	72	63
	3	100	90	80	70	80	72	64	56
	4	87,5	78,7	70	61,2	70	63	56	49
2	1	120	108	96	84	96	86,4	76,8	67,2
	2	108	97,2	86,4	75,6	86,4	77,8	69,1	60,5
	3	96	86,4	76,8	67,2	76,8	69,1	61,4	53,8
	4	84	75,6	67,2	58,8	67,2	60,5	53,8	47
3	1	115	103,5	92	80,5	92	82,8	73,6	64,4
	2	103,5	93,1	82,8	72,4	82,8	74,5	66,2	58
	3	92	82,8	73,6	64,4	73,6	66,2	58,9	51,5
	4	80,5	72,4	64,4	56,3	64,4	58	51,5	45,1
4	1	110	99	88	77	88	79,2	70,4	61,6
	2	99	89.1	79,2	69,3	79,2	71,3	63,4	55,4
	3	88	79,2	70,4	61,6	70,4	63,4	56,3	49,3
	4	77	69,3	61,6	53,9	61,6	55,4	49,3	43,1
5	1	105	94,5	84	73,5	84	75,6	67,2	58,8
	2	94,5	85	75,6	66,1	75,6	68	60,5	52,9
	3	84	75,6	67,2	58,8	67,2	60,5	53,8	47
	4	73,5	66,1	58,8	51,4	58,8	52,9	47	41,2
6	1	**100**	90	80	70	80	72	64	56
	2	90	81	72	63	72	64,8	57,6	50,4
	3	80	72	64	56	64	57,6	51,2	44,8
	4	70	63	56	49	56	50,4	44,8	39,2
7	1	95	85,5	76	66,5	76	68,4	60,8	53,2
	2	85,5	76,9	68,4	59,8	68,4	61,6	54,7	47,9
	3	76	68,4	60,8	53,2	60,8	54,7	48,6	42,6
	4	66,5	59,8	53,2	46,5	53,2	47,9	42,6	37,2
8	1	90	81	72	63	72	64,8	57,6	50,4
	2	81	72,9	64,8	56,7	64,8	58,3	51,8	45,4
	3	72	64,8	57,6	50,4	57,6	51,8	46,1	40,3
	4	63	56,7	50,4	44,1	50,4	45,4	40,3	35,3
9	1	85	76,5	68	59,5	68	61,2	54,4	47,6
	2	76,5	68,8	61,2	53,5	61,2	55,1	49	42,8
	3	68	61,2	54,4	47,6	54,4	49	43,5	38,1
	4	59,5	53,5	47,6	41,6	47,6	42,8	38,1	33,3
10	1	80	72	64	56	64	57,6	51,2	44,8
	2	72	64,8	57,6	50,4	57,6	51,8	46,1	40,3
	3	64	57,6	51,2	44,8	51,2	46,1	40,1	35,8
	4	56	50,4	44,8	39,2	40,3	36,3	32,2	28,2

Окончание таблицы Г.1

Размер	Цвет	1 сорт				2 сорт			
		1	2	3	4	1	2	3	4
11	1	75	67,5	60	52,5	60	54	48	42
	2	67,5	60,7	54	47,2	54	48,6	43,2	37,8
	3	60	54	48	42	48	43,2	38,4	33,6
	4	52,5	47,2	42	36,7	42	37,8	33,6	29,4
12	1	70	63	56	49	56	50,4	44,8	39,2
	2	63	56,7	50,4	44,1	50,4	45,4	40,3	35,3
	3	56	50,4	44,8	39,2	44,8	40,3	35,8	31,4
	4	49	44,1	39,2	34,3	39,2	35,3	31,4	27,4

Т а б л и ц а Г. 2 – Оценка шкурок соболя в зависимости от степени седины по отношению к стоимости первого сорта, %

Наличие седых волос на поверхности шкурки соболя	Группа седины				
	1	2	3	4	5
Наличие седых волос на шкурке равномерно свыше 70 % ее поверхности	150	-	-	-	-
Наличие седых волос от 50 % до 70 % поверхности шкурки	-	140	-	-	-
Наличие седых волос от 30 % до 50 % поверхности шкурки	-	-	130	-	-
Наличие седых волос от 10 % до 30 % поверхности шкурки	-	-	-	120	-
Наличие седых волос на шкурке до 10 % ее поверхности	-	-	-	-	**110**

УДК 636.934.55:006.354 ОКС 59.140.20

Ключевые слова: соболь, волосяной покров, шкурка, пороки, размер, цвет

Подписано в печать 01.10.2014. Формат 60x84 1/8.

Усл. печ. л. 1,86. Тираж 36 экз. Зак. 3520

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru