ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШЕРСТЬ-ЛИНЬКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ

Технические условия

Shedding hair of cattle and horses
Specifications

ГОСТ
13612—77
Взамен
ГОСТ 13612—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 11.77 № 2753 срок введения установлен

с 01.01.79

Постановлением Госстандарта от 22.05.90 № 1244 срок действия продлен

до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на шерсть-линьку, собираемую в течение года при чистке и вычесывании шерсти крупного рогатого скота и лошадей всех пород, породных групп и их помесей

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 1 Шерсть-линька должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1 2 Шерсть линьку подразделяют
по наименованиям на
коровью,
конскую,
по состоянию на
нормальную,
сорную

Примечание По цвету шерсть линьку не подразделяют

1.3 Наименование шерсти-линьки определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл 1

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание

gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Наименование шерсти-линьки	Характеристика шерсти-линьки	Обозначение для маркировки
Линька коровья	Состоит в основном из остевых волокон длиной 15 мм и более, мягких на ощупь, несвалянных или слабо свалянных. Цвет линьки различный	Линька коров
Линька конская	Состоит в основном из жестких остевых волокон длиной 15 мм и более, более упругих и прямых, чем шерсть-линька коровья, несвалянных или слабо свалянных. Цвет линьки различный	Линька конс.

Примечание Шерсть-линьку, не разобранную по наименованиям, относят к конской.

1.4. Состояние шерсти-линьки в зависимости от содержания растительных и минеральных примесей определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Состояние	Характеристика состояния	Обозначение для маркировки
Нормальная	Допускаются растительные и минеральные примеси не более 5 % от массы грязной (немытой) шерсти	Норм.
Сорная	Допускаются растительные и минеральные примеси более 5 % от массы грязной (немытой) шерсти	Сорн.

1.5. Засорение шерсти-линьки посторонними примесями (обрезками ниток, веревок, тряпок) не допускается.

1.6. Шерсть-линька по наименованию должна соответствовать образцам (эталонам), утвержденным в установленном порядке.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку шерсти-линьки на предприятиях промышленности производят партиями. Партией считают количество шерсти-линьки, отгруженное в один адрес и оформленное одним документом, удостоверяющим ее количество и качество.

2.2. Правильность упаковки и маркировки проверяют на всех кипах партии.

2.3. Приемку шерсти-линьки по количеству производят взвешиванием каждой кипы партии в отдельности.

2.4. Приемку шерсти-линьки по качеству производят проверкой 10 % кип, но не менее одной кипы, отобранных от каждого сортимента партии.

Сортиментом считают шерсть-линьку одного наименования и состояния.

Результат проверки распространяют на проверяемый сортимент партии.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Наименование и состояние шерсти-линьки определяют внешним осмотром, разложив ее на столе, предназначенном для классировки.

3.2. При разногласиях наименование шерсти-линьки устанавливают сравнением с образцами (эталонами), а состояние определяют лабораторным методом на предприятиях промышленности.

3.3. Определение массовой доли минеральных и растительных примесей

3.3.1. *Метод отбора проб*

Общую пробу составляют из разовых проб массой не более 50 г каждая, отобранных вручную из каждого отверстия, трафарет-сетки, наложенной на пласт сортимента шерсти-линьки, по которому возникли разногласия. В разовых пробах сохраняют все минеральные и растительные примеси.

Масса общей пробы должна быть (2,0±0,1) кг.

3.3.2. *Аппаратура и материалы*

Для проведения испытания применяют:

весы технические 2-го класса точности;

стол для классировки;

мешочки полиэтиленовые;

бумагу плотную;

трафарет-сетку.

3.3.3. *Подготовка к испытанию*

Общую пробу делят на более мелкие клочки, перемешивают руками после чего раскладывают на столе ровным пластом. Из разных мест пласта мелкими клочками отбирают две лабораторные пробы массой (50±5) г каждая.

Лабораторные пробы немедленно взвешивают на технических весах с погрешностью не более ±0,1 г и упаковывают в плотную бумагу или полиэтиленовые мешочки.

3.3.4. *Проведение испытания*

Из каждой лабораторной пробы минеральные и растительные примеси удаляют механическим путем.

Пробу без растительных и минеральных примесей взвешивают с погрешностью не более ±0,1 г.

3.3.5. *Обработка результатов*

Массовую долю минеральных и растительных примесей (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m - m_1}{m} \cdot 100,$$

где m — масса пробы до испытания, г;

m_1 — масса пробы после выделения из нее минеральных и растительных примесей, г.

3.3.6. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов испытаний двух лабораторных проб.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка и транспортирование шерсти-линьли — по ГОСТ 6070—78 со следующим дополнением: шерсть-линьку упаковывают отдельно по наименованиям и состоянию.

4.2. На торце каждой кипы шерсти должна быть четко нанесена маркировка с указанием:

наименования республики, края, области;
наименования района;
наименования заготконторы;
порядкового номера кипы;
наименования шерсти;
наименования состояния;
массы кипы брутто и нетто, кг;
обозначения настоящего стандарта.

Пример маркировки:

РСФСР
Ростов. обл.
Егорлык РЗК
№ 2
Линька коров
норм.
Бр 60 кг, н-то 58 кг
ГОСТ 13612—77

4.3. Шерсть-линька должна храниться в закрытых складских помещениях на подтоварнике. Допускается хранить шерсть, кроме кип, отобранных для проверки, на подтоварнике под навесом или укрытой брезентом для предохранения от попадания атмосферных осадков и почвенной влаги.

gost.e-ecolog.ru