ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КУНИЦЫ МЯГКОЙ, ГОРСКОЙ, КИДУСА И ХАРЗЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11231—77

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 637.61 : 636.93 : 006.354 Группа С82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КУНИЦЫ МЯГКОЙ, ГОРСКОЙ, КИДУСА И ХАРЗЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Undressed hide of mountain and plain marten. Specifications

ГОСТ 11231—77

Взамен ГОСТ 11231—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 октября 1977 г. № 2376 срок действия установлен

с 01.10. 1978 г.
до 01.10. 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки мягкой и горской куницы, кидуса и харзы из отряда хищных, семейства куньих.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки куницы, кидуса и харзы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки куницы, кидуса и харзы должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап (с когтями), хвоста; обезжирены, очищены от грязи и крови; прирезей мышечной ткани и сухожилий; хрящей из ушей, костей из лап и хвоста; оправлены в длину волосом наружу на правилках, изображенных на чертеже; законсервированы пресно-сухим способом.

1.3. Шкурки мягкой куницы характеризуются пышным мягким или слегка грубоватым волосяным покровом от темно-коричневого до песочно-желтого цвета. Горловое пятно светло-желтого, оранжевого или белого цвета.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Июнь 1978 г.

© Издательство стандартов, 1978

Правилки для шкурок



а—куницы горской и кидуса; *б*—куницы мягкой; *в*—харзы

Шкурки горской куницы характеризуются более длинным и грубоватым волосяным покровом, более светлого окраса, чем у шкурок мягкой куницы, иногда с примесью буроватых или желтоватых тонов. Горловое пятно белого цвета.

Шкурки кидуса (помесь куницы с соболем) характеризуются пышным и шелковистым волосяным покровом различной окраски (от темно-коричневого до песочно-желтого), с одним или более горловыми пятнами желтого цвета или без пятен. Окраска головы светлая. Хвост короче, чем у куницы, но длиннее, чем у соболя.

Шкурки харзы характеризуются низким, грубоватым, прилегающим волосяным покровом. Окраска головы, огузка, хвоста и лап черно-бурая, окраска шеи, передней части хребта и черева желтозолотистая. Горловое пятно белого цвета.

1.4. Шкурки мягкой и горской куницы в зависимости от состояния волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Основной район распространения	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
	Куница мягкая	
Кубанский	Северный Кавказ	Пышный, с густой, высокой слегка грубоватой остью. Мездра плотная. Хвост длинный, пышный
Северный	Европейская часть СССР и Западная Сибирь	Пышный, мягкий и шелковистый.
	Куница горская	
Кавказский	Кавказ и Юго-Западные районы СССР	Рослый, но слегка грубоватый. Мездра плотная
Среднеазиатский	Средняя Азия	Менее густой и мягче, чем у куницы Кавказского кряжа
	Кидус	
—	Урал и Западная Сибирь	Более пышный, плотный и шелковистый по сравнению с куницей. Хвост короче, чем у куницы, глунцевитый, опушение более низкое с густой подпушью
	Харза	
—	Дальний Восток	Низкий, грубоватый, прилегающий, блестящий. Длина хвоста равна почти $^2/_3$ длины шкурки

1.5. Шкурки куницы, кидуса и харзы в зависимости от состояния волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
Первый	Полноволосые, с развившимися остью и пухом. Хвост пышный. Кожевая ткань светлая. Допускается легкая синева на хвосте
Второй	Менее полноволосые с недостаточно развившимися остью и пухом, особенно на шее. Хвост менее пышный, слегка заострен на конце. Кожевая ткань с легкой синевой на хвосте и огузке

Продолжение табл. 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
Третий	Полуволосые, с низкими остью и пухом. Хвост слабо опушен. Кожевая ткань по всей площади синеватая, у шкурок харзы—синяя

1.6. В зависимости от наличия пороков шкурки куницы, кидуса и харзы подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы общей длиной, см	До 5 включ.	Более 5 до 15 включ.	Более 15 до 25 включ.	Более 25 до однократной длины или разорванные поперек
2. Дыры или вытертые места общей площадью, $см^2$	—	До 5 включ.	Более 5 до 15 включ.	Более 15 до 30 включ.
3. Плешины (прелины) общей площадью, $см^2$	—	—	До 10 включ.	Более 10 до 20 включ.
4. Поредение и битость волосяного покрова (признаки линьки)	—	Позднезимние, полноволосые, со слегка поредевшей остью на боках или череве	Ранневесенние, полноволосые, но с поредевшими остью и пухом на боках или на череве. Кожевая ткань слегка утолщенная	Ранневесенние, перезрелые, с поредевшей остью на боках, а у шкурок горской куницы и на шейной части, с потертым волосяным покровом на череве у шкурок мягкой куницы. Кожевая ткань грубоватая
5. Недостача частей шкурки	—	Хвоста	Головы	Головы с шеей, вырезанное черево
6. Неправильная первичная обработка	—	—	—	Комовая сушка

1.7. На шкурках допускается не более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья», или четырех пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.8. Оценку качества шкурок куницы, кидуса и харзы производят в соответствии со справочным приложением.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок куницы, кидуса и харзы— по ГОСТ 12266—66.

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.3. Шкурки куницы, кидуса и харзы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.4. Шкурки куницы, кидуса и харзы хранят в сухом проветриваемом помещении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТАБЛИЦА

Оценки качества шкурок куницы мягкой, горской, кидуса и харзы в процентах

Сорт	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	80,0	72,0	60,0	40,0
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

Примечания:

1. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, а также шкурки весенние и раннеосенние оценивают по соглашению сторон (но не более 25% от стоимости первого сорта).

2. Скидки от зачета по качеству, %:

10 — за снятие пластом или кожевой тканью наружу;

10 — за нестандартное консервирование (недостаточно обезжиренные, непросушенные, парные);

5 — за отсутствие одной лапы.

3. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Ф. И Шрайбштейн*
Корректор *В. А. Ряукайте*

Сдано в наб 25.08.78 Подп. в печ. 11.11.78 0,5 п. л. 0,39 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Точета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3791

gost.e-ecolog.ru